

Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques

SERIE
STATISTIQUES

**DOCUMENT
DE
TRAVAIL**

Enquête Alcool
auprès des usagers du système de soins
novembre 2000

Marie-Claude Mouquet (DREES)
Hervé Villet (ORS Haute-Normandie)

n° 53 – juin 2003

Nos remerciements aux membres de l'équipe projet, aux Observatoires régionaux de santé (ORS), à la Fédération nationale des Observatoires de santé (FNORS) et aux Directions régionales de l'action sanitaire et sociale (DRASS), ainsi qu'aux établissements et aux professionnels de santé pour leur participation active à l'enquête.

RESUME	5
ENVIRON UN CINQUIÈME DE L'ACTIVITÉ DU SYSTÈME DE SOINS CONCERNERAIT DES PATIENTS PRÉSENTANT UN RISQUE D'ALCOOLISATION EXCESSIVE	7
L'ENQUÊTE SUR LA PRÉVALENCE DES PROBLÈMES D'ALCOOL PARMİ LES PERSONNES AYANT RECOURS AU SYSTÈME DE SOINS.....	8
OBJECTIFS	8
MODALITÉS.....	9
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ	9
MÉDECİNS GÉNÉRALİSTES	9
TRAITEMENT DES NON-RÉPONSES DANS L'ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ	10
ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES NON-RÉPONDANTS.....	11
ATTRIBUTION D'UN PROFIL VIS-À-VIS DE L'ALCOOL POUR LES PATIENTS INCLASSABLES.....	11
BILAN DE COLLECTE	12
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS	13
LE DIAGNOSTIC D'ALCOOLISATION EXCESSIVE.....	14
POUR EN SAVOIR PLUS	18
PUBLICATIONS DES RÉSULTATS RÉGIONAUX DE L'ENQUÊTE	18
ANNEXES STATISTIQUES	23
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.....	23
MÉDECİNS GÉNÉRALİSTES.....	25
QUESTIONNAIRES UTILISÉS POUR L'ENQUÊTE.....	105

Résumé

D'après l'enquête réalisée en 2000 auprès des médecins généralistes libéraux et des établissements de santé, un risque d'alcoolisation excessive a pu être repéré chez environ un cinquième des patients ayant recours, pour quelque raison que ce soit, au système de soins un jour donné (18 % en médecine de ville et 20 % en établissement de santé). Les hommes représentent environ les trois quarts des patients ainsi classés à risque d'alcoolisation excessive. Chez les hospitalisés un jour donné, l'alcoolisation excessive concernerait près de la moitié des hommes âgés de 35 à 54 ans et une femme sur cinq du même âge. Chez les généralistes libéraux, elle toucherait deux hommes âgés de 35 à 64 ans sur cinq. En ville comme à l'hôpital, les proportions de patients diagnostiqués comme étant en situation d'alcoolisation excessive sont aussi nettement plus élevées chez les patients en situation de chômage ou de précarité, chez ceux qui déclarent vivre seuls sans enfants, chez ceux qui ont eu au moins un arrêt de travail dans les douze mois précédents ou chez ceux qui déclarent avoir eu, dans l'année écoulée, un accident à l'origine d'une hospitalisation d'au moins 24 heures. Enfin, les patients en invalidité ou en longue maladie comme ceux bénéficiant de l'allocation pour adulte handicapé apparaissent également comme présentant des risques supérieurs à la moyenne. Les disparités régionales sont confirmées avec des proportions de patients estimés comme à risque d'alcoolisation excessive plus élevées en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais et plus faible en Aquitaine mais elles sont, par rapport aux caractéristiques socio-démographiques, de portée relativement réduite.

Environ un cinquième de l'activité du système de soins concernerait des patients présentant un risque d'alcoolisation excessive

La consommation d'alcool a fortement diminué en France depuis la fin des années cinquante mais son niveau y reste l'un des plus importants d'Europe, de même que la mortalité liée à une consommation excessive et régulière d'alcool¹. Les pathologies liées à l'imprégnation éthylique chronique ont, ainsi, été à l'origine, en 1999, de 17 750 décès chez les hommes et 4 650 chez les femmes survenus pour la majeure partie d'entre eux avant 65 ans. Les conséquences de l'alcoolisation excessive dépassent également largement ses effets sur la morbidité directement liée à l'imprégnation éthylique chronique. C'est pour mieux les apprécier, car elles n'ont, jusque là, surtout donné lieu qu'à des études ponctuelles ou localisées, que la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et la Direction générale de la santé (DGS) ont initié en 2000, une enquête, réalisée par les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et les Observatoires régionaux de la santé (ORS), sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins (§ Objectifs de l'enquête).

Cette enquête, réalisée auprès des médecins généralistes libéraux et des établissements de santé, estime que 20 % des patients présents dans un établissement de santé un jour donné² et 18 % des patients vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite présentent un risque d'alcoolisation excessive. Ce risque est estimé à partir de la combinaison de trois éléments : les réponses recueillies au questionnaire DETA, ainsi qu'à trois questions sur la consommation d'alcool issues du questionnaire AUDIT et, enfin l'avis du médecin traitant (§ Le diagnostic d'alcoolisation excessive). Selon cette méthode, un patient est considéré « sans risque » s'il l'est au vu du résultat de chacun des trois types de questionnement et « à risque » s'il l'est dans au moins un des trois. Ceci permet de mieux prendre en compte d'éventuelles situations d'alcoolisation excessive lorsque le recours aux soins est motivé par d'autres pathologies que celles directement liées à l'alcool. Cette méthode qui vise à pallier les effets de sous-déclaration par le patient en cas d'alcoolisation excessive conduit à des estimations plus élevées que celles qui résulteraient de l'emploi d'un seul indicateur. Elle permet, en outre, de repérer, parmi les patients en situation d'alcoolisation excessive, les situations « les plus lourdes » de ceux qui présentent une dépendance à l'alcool. Les risques de dépendance ainsi repérés concernent 7 % des personnes hospitalisées un jour donné et 5 % des patients des médecins généralistes.

Cette enquête donne donc une image de la prévalence des problèmes d'alcool parmi les usagers du système de soins un jour donné même si les pathologies pour lesquelles ils sont pris en charge ne sont pas directement associées à une consommation excessive d'alcool. On

1 Tumeur maligne des lèvres, de la cavité buccale, du pharynx, du larynx ou de l'œsophage, psychose alcoolique, alcoolisme chronique, cirrhose du foie.

2 La population étudiée est celle des personnes ayant recours un jour donné au système de soins. Il ne s'agit donc pas d'une étude représentative de la file active sur une période donnée, mois, semestre ou année. En termes d'étude de population, l'enquête un jour donné sur-représente les patients ayant une durée de séjour plus longue que la moyenne ou fréquentant plus souvent le médecin. On peut penser que les patients atteints de pathologies chroniques en rapport avec l'alcool se trouvent dans ce cas. Dans l'interprétation des résultats il y a aura donc lieu de ne pas confondre la prévalence constatée des problèmes d'alcool parmi les patients présents un jour donné et la prévalence parmi les usagers de l'hôpital ou de la médecine de ville en général.

ne peut par contre pas en déduire une estimation de la prévalence des situations d'alcoolisation excessive dans la population générale dans la mesure où l'enquête ne permet pas de savoir en quoi les problèmes d'alcool repérés ont induit un usage différencié du système de soins.

L'enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins

Objectifs

Les données existantes en matière d'alcool sont à la fois nombreuses et partielles.

La consommation et la vente, la mortalité, l'accidentologie font l'objet de production de données régulières, bien que souvent imparfaites ou incomplètes, en particulier pour la connaissance des variations géographiques. La morbidité et les recours aux soins ont, quant à eux, surtout donné lieu à des études ponctuelles le plus souvent localisées³.

Le manque de données générales, comparables entre les régions, sur les conséquences en termes de morbidité d'une consommation excessive d'alcool est particulièrement notable. C'est pourquoi la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et la Direction générale de la santé (DGS) ont lancé une enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins, patients hospitalisés et consultants de praticiens libéraux. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a participé au financement de cette enquête.

Cette enquête, réalisée à la fin de l'année 2000, par les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour la partie hospitalière et les Observatoires régionaux de la santé (ORS) pour la partie ambulatoire poursuit les trois objectifs suivants :

- mesurer la prévalence des comportements d'alcoolisation excessive dans des populations ayant recours au système de soins ;
- étudier le lien entre motifs de recours aux soins et consommation excessive d'alcool ;
- estimer les niveaux et les modalités de prise en charge de ces patients ayant une consommation excessive d'alcool.

Par ailleurs, les résultats, représentatifs au niveau national comme régional, permettront d'apporter un éclairage complémentaire pour les programmes régionaux de santé ayant pour thème l'alcool.

³ On peut citer l'enquête nationale sur les hospitalisés conduite par le CREDES en 1991-1992, l'enquête sur les patients vus en médecine générale réalisée en 1990 en Picardie, l'enquête en médecine libérale et dans tous les établissements de soins effectuée dans le département de l'Yonne en 1994, une enquête en 1995 dans l'ensemble des établissements de santé du département des Yvelines et l'enquête concernant les établissements de soins de courte durée MCO, de psychiatrie et de soins de suite et réadaptation et les médecins généralistes et psychiatres libéraux en 1998 en Auvergne.

Modalités

Établissements de santé

L'enquête couvre l'hospitalisation dans les établissements de santé des secteurs public et privé, en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, psychiatrie et soins de suite et de réadaptation à l'exclusion des urgences et des services réservés aux enfants et des soins de longue durée.

Le principe d'échantillonnage est celui d'un sondage à deux degrés, l'unité primaire étant l'établissement de santé et l'unité secondaire, le patient hospitalisé un jour donné. La taille de l'échantillon varie d'une région à l'autre en fonction du nombre d'établissements et du nombre de lits occupés. Les taux de sondage sur les établissements et les lits occupés sont modulés de manière à obtenir une taille régionale jugée suffisante. La base de sondage utilisée est la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE).

Le tirage au sort des établissements de santé est réalisé à l'intérieur de sept strates les regroupant de la manière suivante :

- Strate 1 : Centres hospitaliers régionaux (CHR)
- Strate 2 : Centres de lutte contre le cancer (CLCC)
- Strate 3 : Centres hospitaliers (CH) et établissements privés de soins de courte durée en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique (MCO) sous dotation globale
- Strate 4 : Etablissements privés de soins de courte durée MCO sous Objectif quantifié national (OQN) et à tarif d'autorité
- Strate 5 : Hôpitaux locaux (HL) et établissements de soins de suite et réadaptation (SSR) publics et privés
- Strate 6 : Maisons de santé pour maladie mentale, foyers de post-cure pour malades mentaux et foyers de post-cure pour alcooliques publics et privés
- Strate 7 : Centres hospitaliers spécialisés (CHS) en psychiatrie publics et privés.

L'enquête porte sur les patients âgés de 16 ans ou plus tirés au sort présents un jour donné dans les établissements de santé ainsi échantillonnés.

La constitution du fichier national du volet hospitalier et la définition de ses axes d'exploitation ont été réalisés dans le cadre d'un groupe associant la DREES et les DRASS de Poitou-Charentes, Aquitaine, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, La Réunion, Lorraine, Centre, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais et Île-de-France.

Médecins généralistes

L'enquête concerne les médecins généralistes libéraux à l'exclusion des médecins à exercice particulier exclusif (homéopathes, acupuncteurs, angiologues) et des médecins remplaçants.

Le principe d'échantillonnage est celui d'un sondage en grappes constituées par l'ensemble des patients vus par les médecins tirés au sort. La taille minimale de l'échantillon est fixée à

2 000 patients par région ce qui conduit à un nombre minimal de médecins compris entre 80 et 100 selon la taille de la région. La base de sondage utilisée est le fichier ADELI.

Le tirage au sort des médecins est réalisé dans des strates déterminées selon les trois critères suivants :

1. Zone d'implantation par tranche d'unité urbaine (UU)

- Commune rurale
- UU de moins de 10 000 habitants
- UU de 10 000 à 49 999 habitants
- UU de 50 000 à 99 999 habitants
- UU de 100 000 habitants ou plus

2. Ancienneté d'installation locale

- 1999 - 2000
- 1995 - 1998
- 1990 -.1994
- Avant 1990

3. Sexe

L'enquête porte sur les patients âgés de 16 ans ou plus vus, en consultation ou en visite, par les médecins tirés au sort pendant deux jours consécutifs, déterminés par le mois de naissance du médecin, au cours d'une semaine donnée.

La standardisation des données du volet médecine de ville et la constitution du fichier national a été prise en charge par un groupe de travail associant la FNORS et les ORS d'Auvergne, du Centre, de Haute-Normandie, de Picardie et de PACA.

Traitement des non-réponses dans l'enquête auprès des établissements de santé

L'enquête auprès des établissements de santé a été confrontée à des difficultés de collecte entraînant deux types de non-réponses. Le premier provient d'établissements ou de services de soins tirés au sort et n'ayant pas pu finalement réaliser l'enquête. Le second concerne les non-réponses des patients ou des médecins aux variables du questionnaire destinées à appréhender les éventuels problèmes d'alcoolisation excessive rendant ainsi le patient inclassable du point de vue de son profil vis-à-vis de l'alcool (§ Le diagnostic d'alcoolisation excessive). Compte tenu de leur importance, ces non-réponses ont fait l'objet de procédures statistiques de traitement, reposant sur des méthodes de « hot deck ». Ces procédures ont été mises au point par les services statistiques des DRASS de Poitou-Charentes et d'Aquitaine.

L'enquête auprès des médecins généralistes, basée sur un accord préalable de participation des médecins tirés au sort, n'a, quant à elle, pas nécessité de traitement de ce type, en raison d'un petit nombre de patients réputés inclassables.

Établissements ou services non-répondants

Pour les établissements ou services non-répondants, les questionnaires manquants ont été créés par duplication aléatoire de questionnaires collectés dans l'enquête selon la méthode décrite ci-dessous.

Les questionnaires recueillis dans l'enquête sont répartis, pour chaque région, en trente cinq groupes obtenus en croisant les strates d'établissements (au nombre de sept : § Modalités d'enquête dans les établissements de santé) et les grands groupes de disciplines d'équipement (GGDE au nombre de cinq : médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, soins de suite et réadaptation et psychiatrie). Le nombre de questionnaires ainsi obtenu pour chaque groupe est ensuite comparé à un nombre théorique de patients pour ce groupe obtenu à partir du nombre de lits installés collecté dans la SAE. Pour le MCO, où les enfants ne sont pas toujours hospitalisés dans des services spécifiques, ce nombre de lits a été corrigé pour tenir compte de l'hospitalisation des moins de 16 ans à partir des données collectées dans les bases constituées dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). S'il n'y a pas de patients dans l'enquête alcool pour un croisement strate*GGDE (où s'il n'y a pas suffisamment de patients), alors que la SAE indique des patients théoriques, on duplique au hasard des enregistrements ressemblants, en cherchant d'abord dans la région concernée, puis, à défaut, dans les autres régions.

Attribution d'un profil vis-à-vis de l'alcool pour les patients inclassables

Les taux de non réponses aux variables du questionnaire destinées à appréhender les éventuels problèmes d'alcoolisation excessive sont, pour la plupart d'entre eux, supérieurs à 20 % (tableau I-7). L'application de l'algorithme de classement du patient dans un profil vis-à-vis de l'alcool (§ Le diagnostic d'alcoolisation excessive) rend alors le classement impossible pour environ 30 % des patients. Pour ces patients inclassables on affecte donc un profil selon deux types de modalités.

Pour le premier groupe qui représente environ les deux tiers des patients initialement réputés inclassables, on dispose d'une partie des réponses aux questions « alcool ». Ces patients sont classés au vu de ces réponses de la manière suivante :

- les patients sans risque au vu de deux critères sur les trois pris en compte (résultat du test DETA, consommation déclarée d'alcool et avis du médecin) et non-répondants sur le troisième sont classés « sans risque d'alcoolisation excessive »,
- les patients inclassables au test DETA et sur leur consommation déclarée d'alcool mais sans problème d'alcool de l'avis du médecin sont classés « sans risque d'alcoolisation excessive »,
- les patients qui apparaissent dépendants sur leur seule réponse positive à la quatrième question du test DETA et qui apparaissent sans risque et non dépendants au vu de leur consommation déclarée d'alcool et de l'avis du médecin sont classés « sans risque d'alcoolisation excessive » si le résultat de leur test DETA est négatif et « à risque sans dépendance » s'il est positif,
- les patients classés à risque d'alcoolisation excessive et inclassables du point de vue de la dépendance sont classés « à risque sans dépendance ».

Pour le second groupe qui représente environ le tiers des patients initialement réputés inclassables, on ne dispose pas des réponses aux questions « alcool ». On leur attribue donc aléatoirement un profil vis-à-vis de l'alcool. Pour cela, on constitue, dans un premier temps, des groupes de patients ressemblants du point de vue du sexe, de l'âge et de la situation familiale. Ensuite, on attribue, au hasard, à chaque patient inclassable le profil vis-à-vis de l'alcool d'un patient classé ayant les mêmes caractéristiques de sexe, d'âge et de discipline d'hospitalisation que lui. Ce patient ressemblant est cherché, en premier lieu, dans les questionnaires de la région du patient inclassable puis, à défaut, dans ceux de sa ZEAT et enfin, le cas échéant, dans ceux des autres régions.

Le premier type de modalités de classement des patients inclassables a également été appliqué aux patients vus par les médecins généralistes. En revanche, la procédure d'attribution aléatoire d'un profil n'a pas été utilisée. Le petit nombre résiduel de patients inclassables (2,6 %) correspond à des patients ayant refusé de répondre ou dans l'incapacité de le faire et les exploitations statistiques sont faites sur les patients ayant accepté de répondre à l'enquête. Cette procédure équivaut à considérer que ces patients inclassables se répartissent entre les trois modalités de profil vis-à-vis de l'alcool de la même manière que les patients classés.

Bilan de collecte

Les échantillons constitués dans le cadre de cette enquête totalisent 916 établissements et 33 795 patients en milieu hospitalier et 1 844 médecins et 50 372 patients en médecine libérale (tableau 1).

La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane n'ont pas pu réaliser l'enquête auprès des établissements hospitaliers. De plus, l'Auvergne qui avait réalisé le même type d'enquête en 1998 n'a pas refait l'enquête en milieu hospitalier en 2000. On a donc repris, pour les établissements de santé de cette région, les questionnaires collectés dans l'enquête réalisée en 1998. Dans cette enquête, la méthode utilisée pour détecter les patients en alcoolisation excessive est différente de celle utilisée dans l'enquête de 2000. Elle repose d'une part sur le questionnaire DETA et d'autre part sur le diagnostic d'abus ou de dépendance établi par les soignants selon les critères diagnostiques du DSM IV (7 critères, la présence de trois items parmi les sept proposés étant nécessaire et suffisante au diagnostic d'abus ou à celui de dépendance). Cela explique sans doute en partie la répartition, différente de celle des autres régions, entre patients classés à risque sans dépendance et patients classés alcoolodépendants, obtenue pour cette région.

Tableau 1 : Nombre de questionnaires collectés selon la région

Région	Hôpital - Patients présents un jour donné				Médecins généralistes - Patients vus au cours de deux journées d'activité ordinaire	
	Nombre d'établissements enquêtés	Nombre de questionnaires collectés	Nombre de questionnaires créés par duplication	Nombre total de questionnaires	Nombre de médecins enquêtés	Nombre de questionnaires collectés
Alsace	26	978	255	1 233	74	2 315
Aquitaine	61	1 370	271	1 641	64	1 863
Auvergne	0	0	0	0	63	1 827
Basse-Normandie	36	1 271	133	1 404	60	1 738
Bourgogne	35	1 036	236	1 272	73	1 968
Bretagne	36	1 914	75	1 989	77	2 218
Centre	33	1 013	208	1 221	71	1 924
Champagne-Ardenne	34	1 018	47	1 065	56	1 543
Corse	10	686	30	716	57	1 070
Franche-Comté	20	1 038	66	1 104	84	2 200
Haute-Normandie	26	949	133	1 082	81	2 772
Ile-de-France	85	2 716	788	3 504	71	1 756
Languedoc-Roussillon	44	1 687	176	1 863	85	2 257
Limousin	35	1 142	0	1 142	79	2 267
Lorraine	97	2 119	186	2 305	54	1 628
Midi-Pyrénées	39	1 765	260	2 025	60	1 710
Nord - Pas-de-Calais	38	1 727	199	1 926	67	1 972
Pays de la Loire	34	1 298	234	1 532	71	2 030
Picardie	40	1 765	81	1 846	87	2 598
Poitou-Charentes	33	1 483	112	1 595	78	2 106
Provence-Alpes-Côte d'Azur	66	2 612	399	3 011	73	1 810
Rhône-Alpes	70	2 592	221	2 813	89	2 174
France métropolitaine	898	32 179	4 110	36 289	1 574	43 746
Guadeloupe	0	0	0	0	102	1 952
Martinique	0	0	0	0	77	1 963
Guyane	0	0	0	0	31	1 089
La Réunion	18	1 616	0	1 616	60	1 622
France entière	916	33 795	4 110	37 905	1 844	50 372
Auvergne enquête du 28 mai 1998	67	6 286	0	6 286		
Total	983	40 081	4 110	44 191		

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Présentation des résultats

Les résultats agrégés présentés ici concernent, d'une part, la France métropolitaine et, d'autre part, l'ensemble de l'enquête, c'est-à-dire France entière pour la médecine de ville et France métropolitaine + La Réunion pour les établissements de santé (§ Bilan de collecte).

Il s'agit de résultats pondérés représentatifs de l'ensemble des patients âgés de 16 ans ou plus vus en consultation ou en visite au cours d'une semaine par les médecins généralistes ou présents un jour donné dans les établissements de santé appartenant au champ de l'enquête.

Pour l'enquête en milieu hospitalier, les coefficients de pondération sont les ratios (patients SAE)/(patients enquête alcool) des croisements strate*GGDE.

Pour l'enquête en médecine de ville, les données ont fait l'objet de plusieurs redressements successifs, d'abord pour tenir compte :

- du fait que le taux de sondage était différent d'une région à l'autre (puisque la taille des échantillons régionaux de médecins était fixe), un premier coefficient de redressement a été établi afin de permettre une exploitation nationale,
- du taux de participation effective (entre l'acceptation initiale et le retour des questionnaires) des médecins dans chaque strate,
- du poids des deux jours d'enquête dans l'activité complète de la semaine du médecin, poids variable en fonction du nombre total de demi-journées d'activité dans la semaine.

Cette première série de redressements avaient pour but de fournir des résultats représentatifs d'une semaine complète d'activité de tous les médecins généralistes de la région.

Après l'examen des premiers résultats, il s'est avéré nécessaire, afin d'éviter tout biais dans les comparaisons interrégionales, de compenser les difficultés d'inclure tous les patients en cas de forte activité (en particulier dans les régions du nord où les médecins généralistes ont une importante clientèle) et de faire l'enquête en visite. Aussi, un dernier redressement a-t-il été effectué en fonction des données fournies par la Cnamts sur l'activité moyenne des médecins dans chaque région durant le mois d'octobre 2000.

Le diagnostic d'alcoolisation excessive

Les diagnostics d'alcoolisation excessive et de dépendance sont établis à partir de trois sources différentes : le questionnaire DETA, trois questions de consommation issues du questionnaire AUDIT et l'avis du médecin traitant.

Le questionnaire DETA a pour but d'évaluer la conscience qu'a le patient de sa consommation de boissons alcoolisées et de son excès éventuel. Il comporte quatre questions libellées, dans l'enquête, de la manière suivante :

- Au cours de votre vie :
- Avez-vous déjà ressenti le besoin de **D**iminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?
 - Votre **E**ntourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?
 - Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez **T**rop ?
 - Avez-vous déjà eu besoin d'**A**lcool le matin pour vous sentir en forme ?

Le patient est considéré, dans le DETA, comme étant à risque d'alcoolisation excessive s'il donne au moins deux réponses positives.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) est un questionnaire de dépistage des consommateurs d'alcool à problèmes, à usage des médecins généralistes. Il a été mis au point par un groupe d'alcoologues sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il comporte dix questions permettant d'évaluer les risques encourus par la personne interrogée de par sa consommation d'alcool. Les trois premières questions, retenues pour l'enquête, interrogent le patient sur sa consommation d'alcool au cours des douze derniers mois. Les deux premières questions portent sur sa consommation régulière (fréquence et quantité) ; la troisième l'interroge sur la fréquence des ivresses occasionnelles (au moins six verres bus lors d'une occasion particulière).

L'existence d'un problème du patient avec l'alcool est enfin appréciée à travers deux questions renseignées par le médecin traitant :

- Le patient a-t-il un problème avec l'alcool ?
- Existe-t-il des signes de dépendance physique ?

L'évaluation du risque d'alcoolisation excessive du patient, comme celle de sa dépendance vis-à-vis de l'alcool, sont effectués en combinant les réponses à ces trois types de questionnements. Cette méthode permet ainsi de répartir les personnes ayant recours au système de soins en trois groupes (tableau 2) :

- patients sans risque,
- patients à risque sans dépendance,
- patients alcoolodépendants.

Les deux derniers groupes forment ensemble le groupe dénommé dans le document « patients à risque d'alcoolisation excessive ».

La proportion de patients à risque d'alcoolisation excessive est sous-estimée si l'on ne prend en compte qu'un seul critère d'évaluation parmi les trois. Plusieurs facteurs peuvent, en effet, expliquer les écarts entre les différents indicateurs. En premier lieu ils se réfèrent à des périodes de temps différentes (la vie entière pour le test DETA, les douze mois précédents pour la consommation d'alcool, le moment présent pour l'avis du médecin) pouvant induire un mauvais repérage des patients en alcoolisation excessive. Des effets de déclaration peuvent également intervenir comme par exemple une sous-estimation par le patient de sa quantité d'alcool consommée. Enfin, il apparaît que la sensibilité du test DETA⁴, est moins bonne lorsque le questionnaire est administré au cours d'un entretien oral réalisé par le médecin traitant du patient⁵ ; en effet, dans ce cas, le malade ne répondrait pas toujours franchement aux questions devant son médecin pour ne pas altérer le rapport médecin-malade.

Quand, en combinant les trois critères, environ 20 % des patients hospitalisés un jour donné peuvent être considérés à risque d'alcoolisation excessive, le seul questionnement du patient sur sa consommation d'alcool donne un peu plus de 9 % de patients classés à risque

4 C'est-à-dire la probabilité qu'un patient ayant un problème avec l'alcool soit effectivement reconnu comme tel par ses réponses au questionnaire DETA.

5 Des tests réalisés pour valider l'efficacité du questionnaire DETA montrent ainsi que sa sensibilité qui est supérieure à 80 % lorsque le questionnaire est auto-administré aux patients tombe à un peu plus de 50 % lorsque c'est le médecin qui pose les questions au patient (voir « Hospitalisation et alcool dans le département des Yvelines, résultats de l'enquête un jour donné, le 11 avril 1995 », DDASS des Yvelines).

contre un peu plus de 10 % pour l'avis du médecin et près de 13 % avec le questionnaire DETA (tableau 3).

Tableau 2 : Algorithme de classement en profil vis-à-vis de l'alcool

	Profil		
	sans risque (1)	à risque sans dépendance (2)	à risque avec dépendance (3)
DETA	Patient n'ayant jamais eu de problème avec l'alcool au cours de sa vie	Patient ayant actuellement ou ayant eu dans le passé un problème avec l'alcool	
	ET	OU	
Consommation d'alcool dans les douze mois précédents (AUDIT)	<p>Abstinent</p> <p>ou ayant une consommation quotidienne inférieure à 5 verres par jour pour les hommes et 3 verres par jour pour les femmes et une consommation excessive occasionnelle nulle ou inférieure à 1 fois par mois</p> <p>ou consommant de l'alcool au plus 6 fois par semaine et ayant une consommation excessive occasionnelle nulle ou inférieure à 1 fois par mois</p>	<p>Ayant une consommation quotidienne d'au moins 5 verres pour les hommes et d'au moins 3 verres pour les femmes</p> <p>ou ayant une consommation quotidienne inférieure à 5 verres pour les hommes et 3 verres pour les femmes et une consommation excessive occasionnelle comprise entre au moins une fois par mois et presque tous les jours</p> <p>ou consommant de l'alcool au plus 6 fois par semaine et ayant une consommation excessive occasionnelle comprise entre au moins une fois par mois et presque tous les jours</p>	
	ET	OU	
Avis du médecin	Pas de problème avec l'alcool	Problème avec l'alcool	
		ET	
Dépendance		Réponse négative à la 4ème question DETA et consommation actuelle quotidienne inférieure à 7 verres et pas de signes de dépendance physique notés par le médecin	Réponse positive à la 4ème question DETA ou consommation actuelle quotidienne d'au moins 7 verres ou signes de dépendance physique notés par le médecin

(1) Les patients pour lesquels on a deux réponses négatives et une réponse inconnue et les patients non-répondants au DETA et à l'AUDIT mais pour lesquels le médecin dit qu'il n'y a pas de problème avec l'alcool sont reclassés dans cette catégorie.

(2) Les patients ayant donné une réponse positive à la quatrième question DETA mais négatifs d'après tous les autres critères sont reclassés dans cette catégorie.

(3) Exclut les patients ayant donné une réponse positive à la quatrième question DETA mais négatifs d'après tous les autres critères qui ont été reclassés « à risque sans dépendance » (voir note2).

Tableau 3 : Diagnostic d'alcoolisation excessive des patients âgés de 16 ans ou plus ayant recours au système de soins en 2000

	Hôpital - Présents un jour donné			Médecins généralistes - Patients vus une semaine donnée				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive dépendants ou non	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive dépendants ou non	<i>Ensemble des patients classés</i>	Patients inclassables (1)	Ensemble des patients
Résultat du test DETA								
Problème avec l'alcool passé ou présent	0.0	12.9	12.9	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5
Patient réputé indemne	60.5	4.3	64.8	78.3	5.9	84.2	0.1	84.3
Patient inclassable	19.3	3.0	22.3	1.4	0.3	1.7	2.5	4.2
Usage déclaré d'alcool (AUDIT)								
Non-usage	24.8	2.0	26.8	19.8	1.1	20.9	0.1	21.0
Usage non à risque	35.5	4.9	40.4	57.7	5.6	63.3	0.0	63.4
Usage ponctuel à risque	0.0	4.6	4.6	0.0	5.8	5.8	0.0	5.8
Usage régulier à risque	0.0	4.6	4.6	0.0	4.7	4.7	0.0	4.7
Patient inclassable	19.5	4.1	23.6	2.1	0.4	2.6	2.5	5.1
Problème avec l'alcool selon le médecin								
Oui	0.0	10.4	10.4	0.0	8.7	8.7	0.0	8.7
Non	68.2	7.1	75.3	77.6	8.3	85.8	0.0	85.8
NSP / NR	11.5	2.8	14.3	2.1	0.7	2.8	2.6	5.4
Total	79.8	20.2	100.0	79.7	17.7	97.4	2.6	100.0
Nombre de patients			333 300					5 274 500

(1) Ce pourcentage représente les patients ayant refusé de répondre à l'enquête ou dans l'incapacité de le faire; n'ont donc été retenus, pour l'étude, que les patients ayant accepté de répondre ce qui donne une proportion de 18,2 % de patients à risque contre 17,7 % si l'on retient l'ensemble des patients vus; cette modalité ne subsiste pas dans l'enquête hospitalière car les patients inclassables (9 % des hospitalisés un jour donné) se sont vus attribuer un profil face à l'alcool selon un algorithme d'affectation reposant sur la région et la discipline d'hospitalisation, le sexe et l'âge.

Lecture : 4,9 % des patients hospitalisés un jour donné ayant déclaré une consommation d'alcool sans risque pour leur santé par leurs réponses au questionnaire AUDIT ont été classés comme à risque d'alcoolisation excessive d'après leurs réponses au test DETA ou selon l'avis du médecin traitant, selon la procédure décrite dans le tableau 2.

Champ : France métropolitaine.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

C'est ainsi qu'environ 8 % des patients hospitalisés un jour donné classés à risque d'alcoolisation excessive pour l'avis du médecin apparaissent sans risque à travers leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool. Inversement, 38 % d'entre eux, classés à risque d'après leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool sont sans risque de l'avis du médecin.

En ville, c'est également le questionnaire DETA qui donne le résultat le plus élevé avec 11,5 % de patients classés à risque contre 10,5 % pour le questionnement du patient sur sa consommation d'alcool et 9 % de l'avis du médecin. Là encore, ce sont près de 7 % des patients vus qui sont classés à risque d'alcoolisation excessive d'après l'avis du médecin alors qu'ils sont classés sans risque de par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool, et près de 47 % qui sont classés à risque d'après leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool et sont sans risque repéré par le médecin traitant.

Pour en savoir plus

« Expertise collective Alcool Dommages sociaux Abus et dépendance », février 2003, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

« Les risques d'alcoolisation excessive chez les patients ayant recours aux soins un jour donné », M.C. Mouquet et H. Villet avec la collaboration de G. Badéyan, A. Trugeon et D. Fontaine, Etudes et Résultats n° 192, septembre 2002, DREES.

« La mortalité liée à l'imprégnation éthylique chronique en France en 1998 », E. Michel et E. Jouglan, Etudes et Résultats n° 153, janvier 2002, DREES.

« Drogues et dépendances, Indicateurs et tendances 2002 », 2002, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).

« Expertise collective Alcool Effets sur la santé », septembre 2001, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

« Prévalence des conduites addictives chez les patients hospitalisés – Étude multicentrique effectuée un jour donné dans les hôpitaux d'instruction des armées en 1999 » Ph. Arvers, J.P. Mouliat-Pelat, J.D. Favre, G. Auzanneau, J. Brunot et H. Delolme, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 15/2000, 11 avril 2000, Institut de veille sanitaire (InVS).

« L'alcool à chiffres ouverts » textes présentés par C. Got et J. Weill, 1997, Editions Seli Arslan SA.

Publications des résultats régionaux de l'enquête

« Le risque alcoolique chez les patients hospitalisés en Aquitaine en 2001 – Résultats provisoires », G. Astier, Rapport de stage, Documents statistiques Aquitaine, 2001, **DRASS Aquitaine**.

« Alcoolisation excessive en Auvergne – Résultats d'une enquête un jour donné le 28 mai 1998, P. Lonchambon, C. Berger, M. Reynaud, L. Malet, P. Glanddier et S. Ughetto, décembre 1998, **RNSP, DRASS Auvergne et CHU de Clermont-Ferrand**.

« Enquête alcool auprès de la clientèle des médecins généralistes en Basse-Normandie du 16 au 21 octobre 2000 », Le Bulletin de l'Observatoire régional de la Santé de Basse-Normandie, n° 16, 2002, **ORS de Basse-Normandie**.

« Les problèmes d'alcoolisation excessive chez les patients hospitalisés en Basse-Normandie », I. Bigot 2002, 4 pages, **DRASS Basse-Normandie**.

« Les problèmes d'alcoolisation excessive chez les patients hospitalisés en Basse-Normandie », I. Bigot 2003, 40 pages, **DRASS Basse-Normandie**.

« Problèmes d'alcool », Santé bourgogne - Le journal de l'Observatoire régional de la santé de Bourgogne, n°45, octobre 2002, **ORS de Bourgogne**.

« Profil et consommation d'alcool chez les patients hospitalisés en Bretagne », V. Boitard, L'Info Statistique, n° 1, janvier 2003, **DRASS Bretagne**.

« Les conduites de consommation d'alcool dans la clientèle des médecins généralistes en Bretagne », O. Grimaud et L. Pennognon, février 2002, **ORS Bretagne**.

« Enquête alcool auprès des patients hospitalisés – La consommation d'alcool », C. Lefèvre, FLASH STAT Champagne-Ardenne, n° 8, août 2002, **DRASS Champagne-Ardenne**.

« Enquête alcool en médecine libérale en Champagne-Ardenne », 2002, **ORS de Champagne-Ardenne**.

« Enquête alcool en médecine libérale en Corse : premiers résultats régionaux », C. Castelli, A. Mosser et J. Arrighi, 2002, **ORS de Corse**.

« Les conduites d'alcoolisation dans la clientèle des médecins généralistes de Franche-Comté », septembre 2002, **ORS Franche-Comté**.

« Les conduites d'alcoolisation chez les patients hospitalisés en Franche-Comté », décembre 2002, **DRASS Franche-Comté / ORS Franche-Comté**.

« Enquête alcool en médecine libérale en Haute-Normandie – Premiers résultats régionaux », A. Lefebvre et H. Villet, octobre 2001, **ORS de Haute-Normandie**.

« Enquête alcool auprès des patients hospitalisés en Haute-Normandie – Premiers résultats », juin 2002, **DRASS de Haute-Normandie**.

« Enquête Alcool auprès des patients de médecins généralistes libéraux en Ile-de-France », S. Halfen, N. Vongmany et I. Grémy, février 2002, **ORS d'Île-de-France**.

« Enquête alcool en médecine générale en Languedoc-Roussillon - 2000 », C. Defez, H. Boulahtouf, A. Perez et B. Ledesert, février 2002, **ORS du Languedoc-Roussillon**.

« Profils et consommation d'alcool des patients hospitalisés en Languedoc-Roussillon », DRASS Info, n° 30, septembre 2002, **DRASS du Languedoc-Roussillon**.

« Enquête alcool auprès des patients hospitalisés en Limousin », J.P. Denardou, juillet 2001, **DRASS du Limousin**.

« Les conduites de consommation d'alcool chez les patients des médecins généralistes en Limousin », O. Da Silva, F. Burbaud, C. Leclerc, B. Roche-Bigas, L. Andrieux, S. Trocmé-Fabre et A. Ochoa, décembre 2002, **ORS du Limousin**.

« La prévalence de la consommation excessive d'alcool chez les patients hospitalisés », STATISS INFOS Région Lorraine, juin 2002, **DRASS Lorraine**.

« Principaux résultats de l'enquête alcool en médecine générale », Le Bulletin de l'observatoire de la santé de la Martinique, n° 28, 2001, **ORS de la Martinique**.

« L'alcool en médecine de ville et à l'hôpital – Enquête auprès des patients », C. Boré, G. Feyfant-Raymond, M.F. Kmita, F. Cayla et G. Fahet, VECTEUR SANTE en Midi-Pyrénées, les DOSSIERS, novembre 2002, **DRASS de Midi-Pyrénées**.

« Les patients et l'alcool en médecine générale dans la région Nord-Pas de Calais », 2002, **ORS Nord-Pas de Calais**.

« Enquête alcool auprès de la clientèle des médecins généralistes des Pays de la Loire - premiers résultats », décembre 2001, **ORS des Pays de la Loire**.

« Enquête Alcool auprès des patients des médecins généralistes des Pays de la Loire », M.C. Bournot, F. Lelièvre et A. Tallec, septembre 2002, **ORS des Pays de la Loire**.

« Enquête alcool en médecine générale », Santé Pays-de-la-Loire, n° 44, 2002, **ORS des Pays-de-la-Loire**.

« Profils et consommations d'alcool chez les patients hospitalisés », Echo des stat., n° 8, 2002, **DRASS des Pays-de-la-Loire**.

« L'alcool en médecine libérale en Picardie à travers une enquête nationale », 2001, **ORS de Picardie**.

« Consommation d'alcool chez les patients vus en médecine générale en Poitou-Charentes. Résultats d'une enquête épidémiologique », C. Beaujault, 2001, **ORS de Poitou-Charentes**.

« Enquête alcool en Poitou-Charentes : étude de l'alcoolisation dans les populations en situation de soins », Rapport, 2002, **DRASS Poitou-Charentes**.

« Prévalence de la consommation à risque d'alcool dans la clientèle des médecins généralistes : enquête régionale », Le journal de l'URML PACA, n° 10, 2002, **ORS de Provence-Alpes-Côte d'Azur**.

« Enquête alcool auprès des patients hospitalisés – La Réunion novembre 2000 », C. Catteau et A. Galmiche, juillet 2002, **DRASS/SSER de la Réunion**.

« Enquête alcool auprès des patients hospitalisés - Les risques d'alcoolisation excessive chez les patients ayant recours aux soins à la Réunion », C. Catteau, 2002, **DRASS/SSER de la Réunion**.

« L'enquête alcool en Rhône-Alpes - Étude réalisée auprès de la clientèle des médecins généralistes libéraux et des patients hospitalisés », Ph. Laperrouse et A. Sonko, 2001, **DRASS Rhône-Alpes**.

« Enquête alcool en Rhône-Alpes - Étude réalisée auprès de la clientèle des médecins généralistes libéraux et des patients hospitalisés », A.Sonko et Ph.Laperrouse, Les dossiers de la DRASS n° 2003-08-D, mars 2003, **DRASS Rhône-Alpes**.

« Enquête alcool en Rhône-Alpes - Étude auprès de la clientèle des médecins généralistes libéraux et des patients hospitalisés », A.Sonko et Ph.Laperrouse, La lettre de la DRASS, n° 2003-01-L, avril 2003, **DRASS Rhône-Alpes**.

Annexes statistiques

Établissements de santé

Tableau I-1 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et la discipline d'hospitalisation ou le motif de recours.....	29
Tableau I-2 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon la discipline d'hospitalisation ou le motif de recours.....	30
Tableau I-3 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon la discipline d'hospitalisation ou le motif de recours.....	31
Tableau I-4 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les caractéristiques socio-démographiques.....	32
Tableau I-5 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les caractéristiques socio-démographiques.....	34
Tableau I-6 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon les caractéristiques sociales...	36
Graphique I-1 :	Répartition par sexe et âge des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000.....	38
Graphique I-2 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 présentant un risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et l'âge.....	40
Tableau I-7 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les antécédents médicaux.....	41
Tableau I-8 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les antécédents médicaux.....	42
Tableau I-9 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon les antécédents médicaux.....	43
Tableau I-10 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool.....	44
Tableau I-11 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool.....	46
Tableau I-12 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool.....	48

Tableau I-13 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives.....	50
Tableau I-14 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives.....	51
Tableau I-15 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives.....	52
Tableau I-16 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées.....	53
Tableau I-17 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées.....	54
Tableau I-18 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées.....	55
Tableau I-19 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	56
Carte I-1 :	Proportion standardisée de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	58
Tableau I-20 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés alcool-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation..	59
Carte I-2 :	Proportion standardisée de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés alcool-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	61
Tableau I-21 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	62
Carte I-3 :	Proportion standardisée de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	64
Tableau I-22 :	Effet des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 sur le risque d'alcoolisation excessive.....	65
Tableau I-23 :	Effet des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 sur le risque d'alcool-dépendance.....	66

Médecins généralistes

Tableau II-1 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et le type d'acte ou le motif de recours.....	67
Tableau II-2 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le type d'acte ou le motif de recours.....	68
Tableau II-3 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le type d'acte ou le motif de recours.....	69
Tableau II-4 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les caractéristiques socio-démographiques.....	70
Tableau II-5 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les caractéristiques socio-démographiques.....	72
Tableau II-6 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon les caractéristiques sociales.....	74
Graphique II-1 :	Répartition par sexe et âge des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000.....	76
Graphique II-2 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 présentant un risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et l'âge....	78
Tableau II-7 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les antécédents médicaux.....	79
Tableau II-8:	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les antécédents médicaux.....	80
Tableau II-9:	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon les antécédents médicaux.....	81

Tableau II-10 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool.....	82
Tableau II-11 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool.....	84
Tableau II-12 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool.....	86
Tableau II-13 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives.....	88
Tableau II-14 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives.....	89
Tableau II-15 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives.....	90
Tableau II-16 :	Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées.....	91
Tableau II-17 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées.....	92
Tableau II-18 :	Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées.....	93
Tableau II-19 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	94
Carte II-1 :	Proportion standardisée de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	96
Tableau II-20 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés alcoolodépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation	97

Carte II-2 :	Proportion standardisée de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés alcoolo-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	99
Tableau II-21 :	Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	100
Carte II-3 :	Proportion standardisée de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation.....	102
Tableau II-22 :	Effet des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 sur le risque d'alcoolisation excessive.....	103
Tableau II-23 :	Effet des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 sur le risque d'alcoolo-dépendance.....	104

**Tableau I-1 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et la discipline d'hospitalisation ou le motif de recours**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
DISCIPLINE D'HOSPITALISATION										
Médecine	30.9	30.4	30.1	30.3	30.8	30.9	30.5	30.4	30.4	30.8
Chirurgie	24.0	24.8	10.1	19.4	23.1	24.0	24.7	10.1	19.4	23.1
Gynécologie-Obstétrique	6.6	1.5	0.3	1.1	5.4	6.6	1.5	0.3	1.1	5.5
Soins de suite et réadaptation	24.0	20.2	21.7	20.7	23.3	23.9	20.2	21.6	20.7	23.2
Psychiatrie	14.6	23.1	37.8	28.4	17.4	14.5	23.1	37.7	28.4	17.3
NOMBRE DE MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA										
Un seul motif	66.4	62.5	52.1	58.7	64.9	66.4	62.5	52.1	58.8	64.9
Deux motifs ou plus	18.1	23.1	33.8	26.9	19.9	18.1	23.0	33.8	26.9	19.9
Non réponse	15.5	14.4	14.1	14.3	15.2	15.5	14.4	14.1	14.3	15.2
MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA (1)										
Douleur	10.5	8.3	5.6	7.3	9.9	10.5	8.3	5.6	7.3	9.9
Hémorragie	0.9	1.0	1.8	1.3	1.0	0.9	1.0	1.8	1.3	1.0
Insomnie ou trouble du sommeil	0.9	1.8	3.7	2.5	1.2	0.9	1.8	3.6	2.5	1.2
Symptomatologie fonctionnelle	1.4	1.5	0.8	1.3	1.3	1.4	1.5	0.8	1.3	1.3
Traumatologie	11.2	9.8	7.8	9.0	10.7	11.2	9.8	7.8	9.1	10.7
Tumeur maligne	7.1	6.9	5.2	6.3	6.9	7.1	6.9	5.2	6.3	6.9
Pathologie digestive	5.8	8.3	8.9	8.5	6.4	5.8	8.3	8.9	8.5	6.4
Affection cardio-vasculaire	12.6	11.4	5.3	9.2	11.9	12.6	11.4	5.3	9.2	11.9
Affection ostéo-articulaire	5.5	5.3	2.5	4.3	5.2	5.5	5.3	2.5	4.3	5.2
Affection de l'appareil respiratoire	5.5	6.1	3.7	5.2	5.4	5.5	6.1	3.7	5.2	5.4
Affection de l'appareil génito-urinaire	5.6	4.5	1.8	3.5	5.1	5.6	4.5	1.8	3.5	5.2
Grossesse, accouchement, puerpéralité	4.7	1.0	0.2	0.7	3.9	4.7	1.0	0.1	0.7	3.9
Ophthalmologie	1.2	0.7	0.2	0.5	1.1	1.2	0.7	0.2	0.5	1.1
Affection neurologique	5.4	5.8	6.1	5.9	5.5	5.4	5.8	6.2	6.0	5.5
Trouble métabolique ou nutritionnel	3.2	3.3	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.0	3.2	3.2
Affection dermatologique	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2
ORL et stomatologie	1.2	1.6	0.9	1.4	1.2	1.2	1.6	0.9	1.4	1.2
Autre affection somatique	1.5	1.7	1.0	1.5	1.5	1.5	1.7	1.0	1.5	1.5
Trouble psychique	15.8	21.3	32.1	25.2	17.7	15.8	21.3	32.1	25.2	17.7
Tentative de suicide	0.8	1.9	2.3	2.1	1.0	0.8	1.9	2.3	2.1	1.0
Abus ou dépendance aux substances psycho-actives	0.4	6.0	35.3	16.6	3.7	0.4	6.0	35.3	16.6	3.7
Examen ou investigation sans mention de résultats anormaux	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8
Raison économique ou sociale	0.8	1.5	2.7	1.9	1.1	0.8	1.5	2.7	1.9	1.1
Autre motif	2.1	1.9	0.8	1.5	2.0	2.1	2.0	0.9	1.6	2.0
Nombre de patients	265 800	43 100	24 400	67 500	333 300	267 300	43 400	24 700	68 100	335 400

(1) La somme des motifs est supérieure à 100 % car un même patient peut être hospitalisé pour plusieurs motifs.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-2 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon la discipline d'hospitalisation ou le motif de recours**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
DISCIPLINE D'HOSPITALISATION										
Médecine	80.1	12.8	7.2	19.9	102 500	79.9	12.8	7.3	20.1	103 400
Chirurgie	83.0	13.8	3.2	17.0	77 000	82.9	13.9	3.2	17.1	77 500
Gynécologie-Obtétrique	96.0	3.7	0.4	4.0	18 200	96.0	3.6	0.4	4.0	18 400
Soins de suite et réadaptation	82.0	11.2	6.8	18.0	77 700	81.9	11.2	6.8	18.1	77 900
Psychiatrie	66.8	17.2	16.0	33.2	57 900	66.8	17.2	16.0	33.2	58 200
NOMBRE DE MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA										
Un seul motif	81.7	12.4	5.9	18.3	216 200	81.6	12.5	5.9	18.4	217 600
Deux motifs ou plus	72.6	15.0	12.4	27.4	66 300	72.5	15.0	12.5	27.5	66 700
Non réponse	81.0	12.2	6.8	19.0	50 800	80.9	12.3	6.8	19.1	51 100
MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA (1)										
Douleur	85.0	10.9	4.1	15.0	33 000	85.0	10.9	4.2	15.0	33 100
Hémorragie	73.8	13.0	13.2	26.2	3 300	73.7	13.1	13.2	26.3	3 300
Insomnie ou trouble du sommeil	57.9	19.5	22.6	42.1	3 900	57.9	19.5	22.7	42.1	3 900
Symptomatologie fonctionnelle	81.0	14.5	4.5	19.0	4 500	80.9	14.5	4.5	19.1	4 500
Traumatologie	83.0	11.7	5.3	17.0	35 800	82.9	11.8	5.3	17.1	36 000
Tumeur maligne	81.6	12.9	5.5	18.4	23 000	81.6	12.9	5.5	18.4	23 100
Pathologie digestive	72.9	16.8	10.2	27.1	21 200	72.9	16.9	10.2	27.1	21 300
Affection cardio-vasculaire	84.3	12.4	3.3	15.7	39 600	84.3	12.4	3.3	15.7	39 900
Affection ostéo-articulaire	83.4	13.0	3.5	16.6	17 400	83.4	13.0	3.6	16.6	17 500
Affection de l'appareil respiratoire	80.5	14.5	5.0	19.5	18 100	80.4	14.5	5.0	19.6	18 200
Affection de l'appareil génito-urinaire	86.2	11.2	2.6	13.8	17 200	86.2	11.2	2.6	13.8	17 300
Grossesse, accouchement, puerpéralité	96.2	3.5	0.3	3.8	13 000	96.3	3.5	0.3	3.7	13 200
Ophtalmologie	90.7	8.1	1.2	9.3	3 500	90.7	8.0	1.2	9.3	3 600
Affection neurologique	78.2	13.6	8.1	21.8	18 300	78.0	13.7	8.3	22.0	18 500
Trouble métabolique ou nutritionnel	79.6	13.4	6.9	20.4	10 700	79.6	13.5	6.9	20.4	10 800
Affection dermatologique	78.6	14.2	7.1	21.4	4 200	78.6	14.2	7.2	21.4	4 200
ORL et stomatologie	77.3	17.1	5.6	22.7	4 100	77.2	17.1	5.6	22.8	4 100
Autre affection somatique	80.3	14.9	4.8	19.7	5 000	80.1	15.0	4.9	19.9	5 000
Trouble psychique	71.2	15.5	13.3	28.8	59 100	71.1	15.6	13.3	28.9	59 500
Tentative de suicide	59.7	24.0	16.3	40.3	3 400	59.7	24.0	16.3	40.3	3 500
Abus ou dépendance aux substances psycho-actives	8.7	21.1	70.1	91.3	12 300	8.7	21.1	70.2	91.3	12 400
Examen ou investigation sans mention de résultats anormaux	78.4	15.9	5.7	21.6	2 600	78.4	15.8	5.7	21.6	2 700
Raison économique ou sociale	63.3	18.2	18.5	36.7	3 500	63.2	18.3	18.6	36.8	3 500
Autre motif	84.2	12.6	3.1	15.8	6 600	84.1	12.8	3.2	15.9	6 600
Ensemble des patients	79.8	12.9	7.3	20.2	333 300	79.7	12.9	7.4	20.3	335 400

(1) La somme des motifs est supérieure au nombre total de patients car un même patient peut être hospitalisé pour plusieurs motifs.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-3 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon la discipline d'hospitalisation ou le motif de recours**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
DISCIPLINE D'HOSPITALISATION						
Médecine	51.5	33.8	102 500	51.5	33.9	103 400
Chirurgie	50.8	40.3	77 000	50.8	40.4	77 500
Gynécologie-Obstétrique	///	24.0	18 200	///	23.9	18 400
Soins de suite et réadaptation	41.2	25.8	77 700	41.3	25.9	77 900
Psychiatrie	55.7	60.0	57 900	55.8	60.0	58 200
NOMBRE DE MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA						
Un seul motif	46.2	36.9	216 200	46.2	37.0	217 600
Deux motifs ou plus	48.3	38.4	66 300	48.3	38.5	66 700
Non réponse	47.6	38.5	50 800	47.6	38.5	51 100
MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA						
Douleur	41.3	34.6	33 000	41.4	34.7	33 100
Hémorragie	41.6	41.9	3 300	41.8	41.9	3 300
Insomnie ou trouble du sommeil	49.9	58.9	3 900	49.9	58.9	3 900
Symptomatologie fonctionnelle	45.5	39.6	4 500	45.5	39.7	4 500
Traumatologie	41.2	26.0	35 800	41.3	26.1	36 000
Tumeur maligne	52.3	41.5	23 000	52.4	41.6	23 100
Pathologie digestive	50.0	40.9	21 200	50.0	40.9	21 300
Affection cardio-vasculaire	52.2	25.8	39 600	52.2	26.0	39 900
Affection ostéo-articulaire	38.3	32.2	17 400	38.3	32.3	17 500
Affection de l'appareil respiratoire	58.0	28.1	18 100	58.0	28.1	18 200
Affection de l'appareil génito-urinaire	48.0	37.4	17 200	47.9	37.5	17 300
Grossesse, accouchement, puerpéralité	///	13.4	13 000	0.0	13.4	13 200
Ophthalmologie	42.0	19.9	3 500	42.1	19.9	3 600
Affection neurologique	54.1	38.8	18 300	54.2	39.0	18 500
Trouble métabolique ou nutritionnel	43.3	37.7	10 700	43.2	37.9	10 800
Affection dermatologique	46.9	24.6	4 200	47.0	24.7	4 200
ORL et stomatologie	54.9	49.3	4 100	54.9	49.3	4 100
Autre affection somatique	50.5	36.4	5 000	50.6	36.5	5 000
Trouble psychique	50.9	50.8	59 100	51.0	50.9	59 500
Tentative de suicide	40.7	50.1	3 400	40.8	50.1	3 500
Abus ou dépendance aux substances psycho-actives	66.9	75.7	12 300	67.2	75.6	12 400
Examen ou investigation sans mention de résultats anormaux	51.8	46.1	2 600	51.7	46.4	2 700
Raison économique ou sociale	55.4	35.0	3 500	55.7	35.3	3 500
Autre motif	41.6	36.6	6 600	41.7	36.7	6 600
Ensemble des patients	46.8	37.4	333 300	46.9	37.5	335 400

(1) La somme des motifs est supérieure au nombre total de patients car un même patient peut être hospitalisé pour plusieurs motifs.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-4 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et les caractéristiques socio-démographiques**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
SEXE										
Homme	39.0	76.0	76.0	76.0	46.5	39.0	76.1	76.1	76.1	46.5
Femme	60.2	23.2	23.4	23.3	52.8	60.3	23.2	23.3	23.2	52.7
Ne sait pas / Non réponse	0.8	0.8	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.8
AGE										
16 à 24 ans	4.8	6.2	2.0	4.7	4.7	4.8	6.2	2.0	4.7	4.8
25 à 34 ans	9.7	11.2	9.6	10.6	9.9	9.7	11.2	9.6	10.6	9.9
35 à 44 ans	9.3	14.0	24.6	17.8	11.0	9.3	14.0	24.6	17.8	11.0
45 à 54 ans	11.1	20.8	32.9	25.2	14.0	11.1	20.8	32.9	25.2	14.0
55 à 64 ans	10.7	18.3	14.7	17.0	12.0	10.8	18.4	14.8	17.0	12.0
65 à 74 ans	19.5	17.2	8.9	14.2	18.4	19.5	17.2	8.9	14.2	18.4
75 à 84 ans	20.9	8.0	4.8	6.9	18.1	20.8	8.0	4.8	6.8	18.0
85 ans ou plus	12.9	2.8	1.3	2.3	10.8	12.9	2.8	1.3	2.3	10.7
Ne sait pas / Non réponse	1.1	1.4	1.1	1.3	1.2	1.1	1.4	1.1	1.3	1.2
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI										
Emploi stable	15.9	21.5	20.6	21.2	16.9	15.9	21.4	20.5	21.1	16.9
Emploi précaire	1.6	3.8	5.1	4.2	2.1	1.6	3.8	5.1	4.3	2.1
Chômeur	2.0	6.2	14.9	9.4	3.5	2.0	6.3	15.1	9.5	3.5
Retraité	48.0	33.3	19.5	28.3	44.0	47.9	33.3	19.5	28.3	43.9
Au foyer	5.4	3.1	2.8	3.0	4.9	5.5	3.1	2.8	3.0	5.0
Autre	11.4	17.9	20.2	18.7	12.9	11.4	17.8	20.1	18.7	12.9
Ne sait pas / Non réponse	15.7	14.2	16.9	15.2	15.6	15.7	14.2	17.0	15.2	15.6
PROFESSION										
Agriculteur exploitant	6.0	3.8	2.3	3.2	5.4	6.0	3.8	2.3	3.3	5.4
Artisan, commerçant ou chef d'entreprise	6.0	6.3	3.7	5.4	5.9	6.0	6.3	3.7	5.4	5.8
Profession libérale	1.8	1.7	0.9	1.4	1.7	1.8	1.7	0.9	1.4	1.7
Cadre ou profession intellectuelle supérieure	6.5	7.7	5.5	6.9	6.6	6.5	7.7	5.5	6.9	6.5
Profession intermédiaire	5.6	6.6	5.7	6.2	5.7	5.6	6.5	5.6	6.2	5.7
Employé	23.8	22.5	24.5	23.2	23.7	23.8	22.5	24.4	23.2	23.6
Ouvrier	11.0	20.6	24.7	22.1	13.2	10.9	20.6	24.6	22.1	13.2
Sans profession	15.2	12.3	12.1	12.2	14.6	15.3	12.4	12.2	12.3	14.7
Ne sait pas / Non réponse	24.3	18.5	20.6	19.3	23.2	24.3	18.5	20.7	19.3	23.3
DOMICILE										
Domicile stable	84.3	82.9	73.2	79.4	83.3	84.3	82.8	73.2	79.3	83.3
Domicile précaire	2.8	5.7	10.4	7.4	3.7	2.8	5.7	10.4	7.4	3.7
Sans abri	0.7	1.7	4.3	2.7	1.1	0.7	1.7	4.4	2.7	1.1
Ne sait pas / Non réponse	12.3	9.7	12.0	10.6	11.9	12.3	9.7	12.0	10.5	11.9

... / ...

Tableau I-4 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les caractéristiques socio-démographiques (suite et fin)

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
SITUATION FAMILIALE										
Seul sans enfants	28.1	31.0	41.8	34.9	29.5	28.0	31.0	41.7	34.9	29.4
Seul avec enfants	5.6	4.2	6.3	4.9	5.5	5.6	4.2	6.3	4.9	5.5
En couple sans enfants	24.4	25.4	17.1	22.4	24.0	24.4	25.4	17.0	22.3	24.0
En couple avec enfants	16.7	17.4	12.9	15.7	16.5	16.7	17.4	12.9	15.8	16.5
Avec d'autres membres de sa famille	6.1	8.4	6.3	7.7	6.4	6.1	8.5	6.4	7.7	6.4
Avec d'autres membres de sa famille	1.4	1.1	0.7	0.9	1.3	1.4	1.1	0.7	1.0	1.3
En collectivité sans enfants	5.1	2.9	3.0	2.9	4.6	5.1	2.9	3.0	2.9	4.6
En collectivité avec enfants	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2
Ne sait pas / Non réponse	12.4	9.6	11.9	10.4	12.0	12.3	9.6	11.8	10.4	11.9
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)										
Oui	1.4	4.8	12.1	7.4	2.6	1.5	4.9	12.4	7.6	2.7
Non	70.8	69.6	61.6	66.7	70.0	70.7	69.5	61.3	66.5	69.9
Ne sait pas / Non réponse	27.8	25.6	26.3	25.8	27.4	27.8	25.6	26.2	25.8	27.4
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
Oui	4.4	8.8	15.5	11.2	5.8	4.6	9.1	15.8	11.5	6.0
Non	64.1	60.9	49.9	56.9	62.6	63.9	60.5	49.5	56.5	62.4
Ne sait pas / Non réponse	31.5	30.4	34.6	31.9	31.6	31.5	30.4	34.7	31.9	31.6
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
RMI avec ou sans CMU	1.4	4.8	12.1	7.4	2.6	1.5	4.9	12.4	7.6	2.7
CMU sans RMI	3.6	6.2	9.0	7.2	4.3	3.7	6.5	9.2	7.4	4.5
Ni RMI ni CMU	61.9	58.6	47.2	54.5	60.4	61.8	58.3	46.8	54.1	60.2
Ne sait pas / Non réponse	33.0	30.4	31.7	30.9	32.6	33.0	30.4	31.6	30.8	32.6
Nombre de patients	265 800	43 100	24 400	67 500	333 300	267 300	43 400	24 700	68 100	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-5 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon les caractéristiques socio-démographiques**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
SEXE										
Homme	66.9	21.1	12.0	33.1	155 000	66.8	21.2	12.0	33.2	156 000
Femme	91.1	5.7	3.3	8.9	175 800	91.1	5.7	3.3	8.9	176 900
Ne sait pas / Non réponse	81.3	13.5	5.2	18.7	2 500	81.3	13.5	5.2	18.7	2 500
AGE										
16 à 24 ans	80.1	16.9	3.1	19.9	15 800	80.1	16.8	3.1	19.9	16 000
25 à 34 ans	78.1	14.7	7.1	21.9	32 800	78.2	14.7	7.2	21.8	33 200
35 à 44 ans	67.2	16.4	16.4	32.8	36 700	67.2	16.4	16.4	32.8	37 000
45 à 54 ans	63.5	19.2	17.3	36.5	46 600	63.4	19.3	17.3	36.6	46 900
55 à 64 ans	71.3	19.7	9.0	28.7	40 000	71.2	19.7	9.0	28.8	40 400
65 à 74 ans	84.4	12.1	3.5	15.6	61 400	84.4	12.1	3.6	15.6	61 700
75 à 84 ans	92.3	5.7	2.0	7.7	60 200	92.3	5.7	2.0	7.7	60 400
85 ans ou plus	95.7	3.4	0.9	4.3	35 900	95.7	3.4	0.9	4.3	35 900
Ne sait pas / Non réponse	77.3	15.7	7.0	22.7	3 900	77.4	15.7	7.0	22.6	3 900
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI										
Emploi stable	74.7	16.4	8.9	25.3	56 500	74.8	16.3	8.9	25.2	56 800
Emploi précaire	59.6	22.8	17.6	40.4	7 100	59.6	22.8	17.5	40.4	7 200
Chômeur	45.3	23.2	31.4	54.7	11 500	45.4	23.2	31.4	54.6	11 800
Retraité	87.0	9.8	3.2	13.0	146 800	86.9	9.8	3.3	13.1	147 300
Au foyer	87.8	8.1	4.1	12.2	16 500	87.8	8.1	4.1	12.2	16 800
Autre	70.6	17.9	11.5	29.4	42 900	70.5	17.9	11.5	29.5	43 200
Ne sait pas / Non réponse	80.3	11.8	8.0	19.7	52 000	80.2	11.8	8.0	19.8	52 300
PROFESSION										
Agriculteur exploitant	87.9	9.1	3.1	12.1	18 000	87.7	9.2	3.2	12.3	18 200
Artisan, commerçant ou chef d'entreprise	81.4	14.0	4.7	18.6	19 500	81.3	14.0	4.7	18.7	19 600
Profession libérale	83.6	12.6	3.8	16.4	5 800	83.5	12.7	3.9	16.5	5 800
Cadre ou profession intellectuelle supérieure	78.6	15.2	6.1	21.4	21 900	78.7	15.2	6.1	21.3	21 900
Profession intermédiaire	77.9	14.8	7.3	22.1	19 100	77.9	14.8	7.3	22.1	19 100
Employé	80.1	12.3	7.6	19.9	78 900	80.1	12.3	7.6	19.9	79 300
Ouvrier	66.2	20.1	13.7	33.8	44 000	66.1	20.2	13.7	33.9	44 300
Sans profession	83.0	10.9	6.1	17.0	48 600	83.0	10.9	6.1	17.0	49 200
Ne sait pas / Non réponse	83.2	10.3	6.5	16.8	77 500	83.2	10.3	6.5	16.8	78 000
DOMICILE										
Domicile stable	80.7	12.9	6.4	19.3	277 500	80.7	12.9	6.5	19.3	279 200
Domicile précaire	59.7	19.8	20.5	40.3	12 400	59.5	19.9	20.6	40.5	12 500
Sans abri	50.0	20.6	29.4	50.0	3 600	49.9	20.7	29.5	50.1	3 700
Ne sait pas / Non réponse	82.1	10.5	7.4	17.9	39 800	82.1	10.5	7.4	17.9	40 000

... / ...

**Tableau I-5 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon les caractéristiques socio-démographiques (*suite et fin*)**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
SITUATION FAMILIALE										
Seul sans enfants	76.0	13.6	10.4	24.0	98 200	75.9	13.6	10.4	24.1	98 600
Seul avec enfants	81.7	9.8	8.5	18.3	18 200	81.7	9.8	8.5	18.3	18 400
En couple sans enfants	81.1	13.7	5.2	18.9	80 100	81.1	13.7	5.2	18.9	80 500
En couple avec enfants	80.7	13.6	5.7	19.3	55 000	80.7	13.6	5.7	19.3	55 500
Avec d'autres membres de sa famille sans enfants	75.8	17.0	7.2	24.2	21 300	75.6	17.0	7.3	24.4	21 600
Avec d'autres membres de sa famille avec enfants	85.4	10.8	3.8	14.6	4 400	85.3	10.6	4.1	14.7	4 500
En collectivité sans enfants	87.2	8.0	4.8	12.8	15 500	87.2	8.0	4.8	12.8	15 500
En collectivité avec enfants	92.7	7.1	0.1	7.3	700	92.6	7.2	0.1	7.4	800
Ne sait pas / Non réponse	82.4	10.4	7.3	17.6	39 900	82.3	10.4	7.3	17.7	40 000
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)										
Oui	42.9	23.4	33.8	57.1	8 800	43.0	23.3	33.6	57.0	9 100
Non	80.7	12.9	6.4	19.3	233 200	80.7	12.9	6.5	19.3	234 300
Ne sait pas / Non réponse	80.9	12.1	7.0	19.1	91 300	80.9	12.1	7.0	19.1	92 000
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
Oui	60.7	19.7	19.7	39.3	19 200	60.9	19.7	19.4	39.1	20 100
Non	81.6	12.6	5.8	18.4	208 700	81.6	12.6	5.8	18.4	209 300
Ne sait pas / Non réponse	79.6	12.4	8.0	20.4	105 400	79.5	12.4	8.1	20.5	106 000
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
RMI avec ou sans CMU	42.9	23.4	33.8	57.1	8 800	43.0	23.3	33.6	57.0	9 100
CMU sans RMI	66.2	18.6	15.3	33.8	14 400	66.4	18.6	15.0	33.6	15 100
Ni RMI ni CMU	81.8	12.5	5.7	18.2	201 400	81.8	12.5	5.7	18.2	202 000
Ne sait pas / Non réponse	80.8	12.1	7.1	19.2	108 700	80.8	12.1	7.1	19.2	109 200
Ensemble des patients	79.8	12.9	7.3	20.2	333 300	79.7	12.9	7.4	20.3	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-6 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon les caractéristiques sociales**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
SEXE						
Homme	///	44.1	155 000	///	44.2	156 000
Femme	///	31.7	175 800	///	31.7	176 900
Ne sait pas / Non réponse	///	28.8	2 500	///	29.1	2 500
AGE						
16 à 24 ans	49.0	///	15 800	48.7	///	16 000
25 à 34 ans	40.7	///	32 800	40.6	///	33 200
35 à 44 ans	53.3	///	36 700	53.3	///	37 000
45 à 54 ans	56.0	///	46 600	56.0	///	46 900
55 à 64 ans	55.6	///	40 000	55.7	///	40 400
65 à 74 ans	50.7	///	61 400	50.7	///	61 700
75 à 84 ans	40.2	///	60 200	40.2	///	60 400
85 ans ou plus	27.3	///	35 900	27.3	///	35 900
Ne sait pas / Non réponse	50.3	///	3 900	50.3	///	3 900
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI						
Emploi stable	50.0	69.6	56 500	50.0	69.6	56 800
Emploi précaire	55.4	45.3	7 100	55.4	45.3	7 200
Chômeur	59.8	64.0	11 500	59.9	63.8	11 800
Retraité	45.2	12.5	146 800	45.3	12.5	147 300
Au foyer	4.0	48.6	16 500	4.1	48.4	16 800
Autre	58.7	63.3	42 900	58.7	63.3	43 200
Ne sait pas / Non réponse	47.6	41.3	52 000	47.7	41.4	52 300
PROFESSION						
Agriculteur exploitant	49.4	15.7	18 000	49.6	15.9	18 200
Artisan, commerçant ou chef d'entreprise	60.8	31.3	19 500	60.8	31.4	19 600
Profession libérale	54.5	43.2	5 800	54.4	43.4	5 800
Cadre ou profession intellectuelle supérieure	60.0	43.8	21 900	59.9	43.9	21 900
Profession intermédiaire	46.2	43.3	19 100	46.2	43.3	19 100
Employé	37.3	41.0	78 900	37.3	41.1	79 300
Ouvrier	71.3	43.0	44 000	71.4	43.0	44 300
Sans profession	33.2	40.5	48 600	33.2	40.5	49 200
Ne sait pas / Non réponse	43.0	31.6	77 500	43.0	31.7	78 000
DOMICILE						
Domicile stable	45.4	36.3	277 500	45.4	36.4	279 200
Domicile précaire	64.6	54.7	12 400	64.6	54.6	12 500
Sans abri	73.9	66.0	3 600	74.1	66.2	3 700
Ne sait pas / Non réponse	48.7	37.4	39 800	48.7	37.4	40 000

... / ...


**Tableau I-6 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon les caractéristiques sociales (suite et fin)**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
SITUATION FAMILIALE						
Seul sans enfants	43.6	34.5	98 200	43.7	34.6	98 600
Seul avec enfants	26.6	33.0	18 200	26.5	33.1	18 400
En couple sans enfants	54.1	35.0	80 100	54.1	35.0	80 500
En couple avec enfants	48.4	55.3	55 000	48.3	55.3	55 500
Avec d'autres membres de sa famille sans enfants	53.6	26.9	21 300	53.7	27.1	21 600
Avec d'autres membres de sa famille avec enfants	28.4	26.7	4 400	28.4	26.7	4 500
En collectivité sans enfants	45.0	36.8	15 500	45.1	36.8	15 500
En collectivité avec enfants	32.6	15.7	700	32.7	15.8	800
Ne sait pas / Non réponse	46.8	34.4	39 900	46.8	34.4	40 000
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)						
Oui	58.8	68.1	8 800	58.8	68.1	9 100
Non	46.3	37.2	233 200	46.3	37.2	234 300
Ne sait pas / Non réponse	47.1	35.1	91 300	47.1	35.1	92 000
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)						
Oui	55.4	52.9	19 200	55.1	52.5	20 100
Non	44.8	35.0	208 700	44.8	35.0	209 300
Ne sait pas / Non réponse	49.4	39.5	105 400	49.4	39.6	106 000
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)						
RMI avec ou sans CMU	58.8	68.1	8 800	58.8	68.1	9 100
CMU sans RMI	55.8	48.4	14 400	55.4	47.9	15 100
Ni RMI ni CMU	44.8	34.8	201 400	44.8	34.9	202 000
Ne sait pas / Non réponse	48.4	38.4	108 700	48.4	38.4	109 200
Ensemble des patients	46.8	37.4	333 300	46.9	37.5	335 400


Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,
enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Graphique I-1 : Répartition par sexe et âge des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000

Ensemble des patients




Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive




... / ...

Graphique I-1 : Répartition par sexe et âge des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 (suite et fin)

Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants



Patients dépendants à l'alcool





Champ : France métropolitaine.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Graphique I-2 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 présentant un risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et l'âge



□ Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants □ Patients dépendants à l'alcool

Champ : France métropolitaine.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-7 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et les antécédents médicaux**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)										
Oui	8.2	11.4	12.5	11.8	8.9	8.2	11.4	12.5	11.8	8.9
Non	61.5	61.4	56.9	59.8	61.2	61.5	61.3	57.0	59.7	61.1
Ne sait pas / Non réponse	30.3	27.2	30.6	28.4	29.9	30.3	27.2	30.5	28.4	29.9
PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE										
Oui	23.9	28.5	28.9	28.7	24.9	23.9	28.6	28.8	28.7	24.9
Non	58.0	56.2	53.7	55.3	57.4	58.0	56.1	53.8	55.3	57.4
Ne sait pas / Non réponse	18.1	15.3	17.4	16.1	17.7	18.1	15.3	17.4	16.1	17.7
EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)										
Oui	42.2	45.6	40.5	43.8	42.5	42.1	45.6	40.4	43.7	42.5
Non	43.1	41.2	44.2	42.3	43.0	43.2	41.2	44.2	42.3	43.0
Ne sait pas / Non réponse	14.7	13.2	15.3	13.9	14.5	14.7	13.2	15.4	14.0	14.5
HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT										
Oui	8.3	10.0	12.8	11.0	8.8	8.3	10.1	12.8	11.1	8.8
Non	72.9	73.9	67.2	71.4	72.6	73.0	73.8	67.2	71.4	72.6
Ne sait pas / Non réponse	18.8	16.1	20.0	17.5	18.5	18.8	16.1	20.0	17.5	18.5
AU MOINS UN ARRÊT DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS										
Oui	8.9	16.4	21.8	18.3	10.8	8.9	16.4	21.6	18.3	10.8
Non	69.5	64.1	55.0	60.8	67.8	69.6	64.1	55.2	60.9	67.8
Ne sait pas / Non réponse	21.6	19.5	23.2	20.8	21.4	21.6	19.6	23.1	20.9	21.4
Nombre de patients	265 800	43 100	24 400	67 500	333 300	267 300	43 400	24 700	68 100	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,
enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-8 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon les antécédents médicaux**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPÉ (AAH)										
Oui	73.2	16.5	10.3	26.8	29 700	73.1	16.6	10.3	26.9	29 900
Non	80.2	13.0	6.8	19.8	203 800	80.2	13.0	6.9	19.8	205 000
Ne sait pas / Non réponse	80.8	11.7	7.5	19.2	99 800	80.7	11.8	7.5	19.3	100 500
PATIENT EN INVALIDITÉ OU LONGUE MALADIE										
Oui	76.7	14.8	8.5	23.3	82 800	76.6	14.9	8.5	23.4	83 400
Non	80.5	12.6	6.9	19.5	191 500	80.5	12.6	6.9	19.5	192 700
Ne sait pas / Non réponse	81.6	11.2	7.2	18.4	59 000	81.5	11.2	7.2	18.5	59 300
EXONÉRATION DU TICKET MODÉRATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DURÉE (ALD)										
Oui	79.1	13.9	7.0	20.9	141 700	79.1	13.9	7.0	20.9	142 400
Non	80.1	12.4	7.5	19.9	143 200	80.0	12.4	7.6	20.0	144 200
Ne sait pas / Non réponse	80.6	11.7	7.7	19.4	48 400	80.4	11.7	7.8	19.6	48 800
HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT										
Oui	74.7	14.7	10.6	25.3	29 500	74.6	14.8	10.7	25.4	29 700
Non	80.1	13.1	6.8	19.9	242 000	80.0	13.1	6.8	20.0	243 600
Ne sait pas / Non réponse	80.9	11.2	7.9	19.1	61 800	80.8	11.3	7.9	19.2	62 100
AU MOINS UN ARRÊT DE TRAVAIL PRÉSCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS										
Oui	65.6	19.6	14.8	34.4	35 900	65.6	19.6	14.8	34.4	36 200
Non	81.8	12.2	6.0	18.2	225 900	81.8	12.2	6.0	18.2	227 400
Ne sait pas / Non réponse	80.3	11.8	7.9	19.7	71 500	80.2	11.8	8.0	19.8	71 800
Ensemble des patients	79.8	12.9	7.3	20.2	333 300	79.7	12.9	7.4	20.3	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,
enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-9 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon les antécédents médicaux**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)						
Oui	60.8	66.4	29 700	60.9	66.4	29 900
Non	44.7	34.5	203 800	44.7	34.6	205 000
Ne sait pas / Non réponse	47.1	34.9	99 800	47.1	34.9	100 500
PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE						
Oui	54.5	47.6	82 800	54.5	47.6	83 400
Non	43.7	34.6	191 500	43.7	34.7	192 700
Ne sait pas / Non réponse	46.4	32.6	59 000	46.4	32.6	59 300
EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)						
Oui	50.9	38.3	141 700	50.9	38.4	142 400
Non	42.3	37.6	143 200	42.3	37.7	144 200
Ne sait pas / Non réponse	48.5	34.3	48 400	48.6	34.4	48 800
HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT						
Oui	49.4	34.9	29 500	49.5	35.0	29 700
Non	46.5	38.8	242 000	46.5	38.8	243 600
Ne sait pas / Non réponse	47.0	33.4	61 800	47.0	33.4	62 100
AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS						
Oui	52.6	68.0	35 900	52.6	68.0	36 200
Non	45.6	33.4	225 900	45.6	33.5	227 400
Ne sait pas / Non réponse	47.9	34.8	71 500	48.0	34.9	71 800
Ensemble des patients	46.8	37.4	333 300	46.9	37.5	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,
enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-10 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS										
Fréquence de la consommation d'alcool										
Jamais	31.1	13.2	4.2	9.9	26.8	31.2	13.2	4.3	10.0	26.9
1 fois par mois ou moins	19.3	9.8	3.7	7.6	16.9	19.3	9.8	3.7	7.6	16.9
2 à 4 fois par mois	10.9	13.5	3.6	9.9	10.7	10.9	13.4	3.6	9.9	10.7
2 à 3 fois par semaine	4.8	14.2	6.5	11.4	6.1	4.8	14.2	6.5	11.4	6.1
4 à 6 fois par semaine	1.5	5.4	6.6	5.8	2.4	1.5	5.4	6.6	5.8	2.4
Tous les jours	10.2	28.0	57.1	38.6	15.9	10.1	27.9	57.1	38.5	15.9
Ne sait pas / Non réponse	22.3	16.0	18.3	16.8	21.2	22.3	16.0	18.2	16.8	21.2
En cas de consommation d'alcool, nombre de verres consommés quotidiennement										
1 ou 2 verres	38.8	27.0	7.0	19.7	34.9	38.7	26.9	7.0	19.7	34.8
3 ou 4 verres	6.0	23.7	10.5	18.9	8.6	5.9	23.6	10.6	18.9	8.6
5 ou 6 verres	0.4	13.1	12.9	13.0	3.0	0.4	13.0	12.9	13.0	3.0
7 à 9 verres	0.1	2.5	13.8	6.6	1.4	0.1	2.5	13.8	6.6	1.4
10 verres ou plus	0.0	2.8	30.1	12.6	2.6	0.0	2.8	30.0	12.6	2.6
Non réponse	1.4	1.9	3.2	2.3	1.6	1.4	1.9	3.2	2.4	1.6
Sans objet	31.1	13.2	4.2	9.9	26.8	31.2	13.2	4.3	10.0	26.9
Ne sait pas / Non réponse	22.3	16.0	18.3	16.8	21.2	22.3	16.0	18.2	16.8	21.2
Fréquence de consommation de 6 verres ou davantage au cours de la même occasion										
Jamais	68.8	34.5	13.9	27.0	60.3	68.8	34.6	13.9	27.1	60.3
Moins d'1 fois par mois	7.6	16.2	7.9	13.2	8.7	7.6	16.2	7.9	13.2	8.7
1 fois par mois	0.1	21.2	9.9	17.1	3.5	0.1	21.1	9.9	17.0	3.5
1 fois par semaine	0.0	8.2	13.0	9.9	2.0	0.0	8.1	13.1	9.9	2.0
Tous les jours ou presque	0.0	2.3	33.9	13.8	2.8	0.0	2.3	33.8	13.8	2.8
Ne sait pas / Non réponse	23.5	17.7	21.3	19.0	22.6	23.5	17.7	21.3	19.0	22.6
USAGE DECLARE D'ALCOOL										
Non-usage	31.1	13.2	4.2	9.9	26.8	31.2	13.2	4.3	10.0	26.9
Usage sans risque	44.5	31.6	11.3	24.3	40.4	44.4	31.6	11.3	24.3	40.3
Usage ponctuel à risque	0.0	26.9	15.3	22.7	4.6	0.0	26.8	15.4	22.7	4.6
Usage régulier à risque	0.0	9.1	47.0	22.8	4.6	0.0	9.0	46.9	22.8	4.6
Patient inclassable	24.5	19.2	22.2	20.3	23.6	24.5	19.2	22.2	20.3	23.6

... / ...

**Tableau I-10 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool (suite et fin)**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
TEST DETA										
Au cours de votre vie :										
Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	2.4	54.8	67.0	59.2	13.9	2.4	54.9	66.9	59.2	14.0
Non	73.1	30.4	18.4	26.1	63.6	73.1	30.3	18.5	26.0	63.5
Ne sait pas / Non réponse	24.5	14.7	14.6	14.7	22.5	24.5	14.8	14.6	14.7	22.5
Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	1.0	40.8	65.0	49.6	10.9	1.0	40.9	65.1	49.7	10.9
Non	75.0	44.8	19.8	35.8	67.1	75.0	44.7	19.8	35.7	67.0
Ne sait pas / Non réponse	24.0	14.4	15.2	14.6	22.1	24.0	14.4	15.2	14.7	22.1
Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez Trop ?										
Oui	1.9	55.8	69.6	60.8	13.8	1.9	55.8	69.6	60.8	13.8
Non	74.0	29.4	15.2	24.3	63.9	74.0	29.4	15.3	24.3	63.9
Ne sait pas / Non réponse	24.1	14.7	15.1	14.9	22.3	24.1	14.8	15.1	14.9	22.3
Avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le matin pour vous sentir en forme ?										
Oui	0.2	6.2	51.9	22.7	4.7	0.2	6.2	52.1	22.8	4.8
Non	76.2	79.2	33.3	62.6	73.4	76.2	79.2	33.1	62.5	73.4
Ne sait pas / Non réponse	23.6	14.6	14.8	14.7	21.8	23.6	14.6	14.8	14.7	21.8
RESULTAT DU TEST DETA										
Problème avec l'alcool passé ou présent										
Patient réputé indemne	0.0	57.9	74.0	63.7	12.9	0.0	58.0	74.1	63.8	13.0
Patient inclassable	75.8	27.4	11.0	21.4	64.8	75.8	27.3	11.0	21.4	64.8
	24.2	14.7	14.9	14.8	22.3	24.2	14.8	14.9	14.8	22.3
PROBLEME AVEC L'ALCOOL SELON LE MEDECIN										
Oui	0.0	32.8	84.4	51.4	10.4	0.0	32.8	84.4	51.5	10.5
Non	85.5	51.7	5.3	34.9	75.3	85.5	51.6	5.3	34.8	75.2
Ne sait pas / Non réponse	14.5	15.6	10.3	13.7	14.3	14.5	15.6	10.3	13.7	14.3
SIGNES DE DEPENDANCE PHYSIQUE SELON LE MEDECIN										
Sans objet	85.5	51.7	5.3	34.9	75.3	85.5	51.6	5.3	34.8	75.2
Oui	0.0	0.0	59.8	21.6	4.4	0.0	0.0	59.9	21.7	4.4
Non	1.3	31.3	22.9	28.2	6.8	1.3	31.3	22.8	28.2	6.8
Ne sait pas / Non réponse	13.1	17.1	12.1	15.3	13.5	13.1	17.1	12.0	15.2	13.6
Nombre de patients	265 800	43 100	24 400	67 500	333 300	267 300	43 400	24 700	68 100	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-11 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS										
Fréquence de la consommation d'alcool										
Jamais	92.5	6.3	1.2	7.5	89 200	92.5	6.4	1.2	7.5	90 100
1 fois par mois ou moins	90.9	7.5	1.6	9.1	56 300	90.8	7.5	1.6	9.2	56 600
2 à 4 fois par mois	81.3	16.2	2.5	18.7	35 700	81.2	16.3	2.5	18.8	35 900
2 à 3 fois par semaine	62.2	30.1	7.7	37.8	20 400	62.1	30.1	7.9	37.9	20 500
4 à 6 fois par semaine	50.7	29.1	20.2	49.3	7 900	50.5	29.1	20.3	49.5	8 000
Tous les jours	51.0	22.7	26.3	49.0	53 100	50.8	22.7	26.5	49.2	53 300
Ne sait pas / Non réponse	83.9	9.7	6.3	16.1	70 700	83.9	9.8	6.3	16.1	71 000
En cas de consommation d'alcool, nombre de verres consommés quotidiennement										
1 ou 2 verres	88.6	10.0	1.5	11.4	116 400	88.5	10.0	1.5	11.5	116 900
3 ou 4 verres	55.4	35.6	9.0	44.6	28 600	55.2	35.7	9.1	44.8	28 800
5 ou 6 verres	10.9	57.1	32.0	89.1	9 900	10.8	57.0	32.2	89.2	9 900
7 à 9 verres	5.4	23.0	71.6	94.6	4 700	5.4	22.9	71.7	94.6	4 700
10 verres ou plus	0.7	13.8	85.4	99.3	8 600	0.8	13.8	85.4	99.2	8 700
Non réponse	69.7	15.5	14.8	30.3	5 200	69.5	15.6	14.9	30.5	5 300
Sans objet	92.5	6.3	1.2	7.5	89 200	92.5	6.4	1.2	7.5	90 100
Ne sait pas / Non réponse	83.9	9.7	6.3	16.1	70 700	83.9	9.8	6.3	16.1	71 000
Fréquence de consommation de 6 verres ou davantage au cours de la même occasion										
Jamais	90.9	7.4	1.7	9.1	201 000	90.9	7.4	1.7	9.1	202 400
Moins d'1 fois par mois	69.4	23.9	6.7	30.6	29 100	69.3	24.0	6.7	30.7	29 300
1 fois par mois	2.0	77.5	20.5	98.0	11 800	2.0	77.4	20.6	98.0	11 800
1 fois par semaine	1.1	51.9	47.0	98.9	6 800	1.1	51.6	47.3	98.9	6 800
Tous les jours ou presque	0.4	10.7	88.9	99.6	9 300	0.4	10.7	88.9	99.6	9 400
Ne sait pas / Non réponse	83.0	10.1	6.9	17.0	75 300	82.9	10.2	7.0	17.1	75 700
USAGE DECLARE D'ALCOOL										
Non-usage	92.5	6.3	1.2	7.5	89 200	92.5	6.4	1.2	7.5	90 100
Usage sans risque	87.8	10.1	2.0	12.2	134 600	87.8	10.2	2.1	12.2	135 100
Usage ponctuel à risque	0.0	75.6	24.4	100.0	15 300	0.0	75.4	24.6	100.0	15 500
Usage régulier à risque	0.0	25.4	74.6	100.0	15 400	0.0	25.3	74.7	100.0	15 500
Patient inclassable	82.6	10.5	6.9	17.4	78 800	82.6	10.5	6.9	17.4	79 200

... / ...

**Tableau I-11 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool (suite et fin)**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
TEST DETA										
Au cours de votre vie :										
Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	13.8	50.9	35.3	86.2	46 400	13.8	50.9	35.3	86.2	46 800
Non	91.7	6.2	2.1	8.3	211 900	91.7	6.2	2.1	8.3	213 100
Ne sait pas / Non réponse	86.8	8.5	4.8	13.2	75 000	86.7	8.5	4.8	13.3	75 500
Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	7.5	48.6	43.9	92.5	36 200	7.5	48.5	43.9	92.5	36 600
Non	89.2	8.6	2.2	10.8	223 500	89.2	8.6	2.2	10.8	224 800
Ne sait pas / Non réponse	86.6	8.4	5.0	13.4	73 600	86.5	8.4	5.1	13.5	74 000
Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez Trop ?										
Oui	10.8	52.2	37.0	89.2	46 000	10.7	52.2	37.0	89.3	46 400
Non	92.3	5.9	1.7	7.7	213 100	92.3	6.0	1.8	7.7	214 300
Ne sait pas / Non réponse	86.5	8.6	5.0	13.5	74 200	86.4	8.6	5.0	13.6	74 700
Avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le matin pour vous sentir en forme ?										
Oui	2.9	16.8	80.2	97.1	15 800	2.9	16.8	80.3	97.1	16 000
Non	82.7	13.9	3.3	17.3	244 700	82.7	14.0	3.3	17.3	246 200
Ne sait pas / Non réponse	86.4	8.6	5.0	13.6	72 800	86.3	8.7	5.0	13.7	73 200
RESULTAT DU TEST DETA										
Problème avec l'alcool passé ou présent										
Patient réputé indemne	93.3	5.5	1.2	6.7	216 000	93.3	5.5	1.2	6.7	217 200
Patient inclassable	86.6	8.5	4.9	13.4	74 300	86.5	8.6	4.9	13.5	74 800
PROBLEME AVEC L'ALCOOL SELON LE MEDECIN										
Oui	0.0	40.6	59.4	100.0	34 700	0.0	40.6	59.4	100.0	35 100
Non	90.6	8.9	0.5	9.4	250 900	90.6	8.9	0.5	9.4	252 300
Ne sait pas / Non réponse	80.6	14.1	5.3	19.4	47 700	80.6	14.1	5.3	19.4	48 000
SIGNES DE DEPENDANCE PHYSIQUE SELON LE MEDECIN										
Sans objet										
Oui	0.0	0.0	100.0	100.0	14 600	0.0	0.0	100.0	100.0	14 800
Non	15.8	59.5	24.7	84.2	22 600	15.8	59.5	24.7	84.2	22 800
Ne sait pas / Non réponse	77.2	16.3	6.5	22.8	45 200	77.2	16.3	6.5	22.8	45 500
Ensemble des patients	79.8	12.9	7.3	20.2	333 300	79.7	12.9	7.4	20.3	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-12 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS						
Fréquence de la consommation d'alcool						
Jamais	33.6	32.4	89 200	33.6	32.5	90 100
1 fois par mois ou moins	33.2	35.2	56 300	33.3	35.3	56 600
2 à 4 fois par mois	48.5	40.9	35 700	48.5	40.9	35 900
2 à 3 fois par semaine	63.3	48.7	20 400	63.3	48.8	20 500
4 à 6 fois par semaine	70.7	53.1	7 900	70.7	53.2	8 000
Tous les jours	72.8	45.3	53 100	72.9	45.4	53 300
Ne sait pas / Non réponse	46.7	32.9	70 700	46.8	33.0	71 000
En cas de consommation d'alcool, nombre de verres consommés quotidiennement						
1 ou 2 verres	43.7	34.9	116 400	43.7	35.0	116 900
3 ou 4 verres	73.6	51.0	28 600	73.7	51.1	28 800
5 ou 6 verres	81.4	62.1	9 900	81.5	62.2	9 900
7 à 9 verres	78.3	67.0	4 700	78.3	67.0	4 700
10 verres ou plus	80.4	70.1	8 600	80.5	70.1	8 700
Non réponse	49.6	40.0	5 200	49.7	40.1	5 300
Sans objet	33.6	32.4	89 200	33.6	32.5	90 100
Ne sait pas / Non réponse	46.7	32.9	70 700	46.8	33.0	71 000
Fréquence de consommation de 6 verres ou davantage au cours de la même occasion						
Jamais	38.3	33.4	201 000	38.3	33.5	202 400
Moins d'1 fois par mois	72.2	49.6	29 100	72.2	49.7	29 300
1 fois par mois	81.6	57.3	11 800	81.6	57.4	11 800
1 fois par semaine	80.7	62.4	6 800	80.8	62.6	6 800
Tous les jours ou presque	79.2	74.9	9 300	79.2	74.8	9 400
Ne sait pas / Non réponse	47.3	33.4	75 300	47.4	33.5	75 700
USAGE DECLARE D'ALCOOL						
Non-usage	33.6	32.4	89 200	33.6	32.5	90 100
Usage sans risque	48.0	36.8	134 600	48.0	36.8	135 100
Usage ponctuel à risque	82.8	56.1	15 300	82.8	56.2	15 500
Usage régulier à risque	74.8	72.1	15 400	74.9	72.2	15 500
Patient inclassable	47.4	33.9	78 800	47.5	33.9	79 200

... / ...

**Tableau I-12 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool (suite et fin)**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
TEST DETA						
Au cours de votre vie :						
Avez-vous déjà ressenti le besoin de <u>D</u> iminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?						
Oui	75.3	62.3	46 400	75.4	62.3	46 800
Non	41.2	33.4	211 900	41.2	33.5	213 100
Ne sait pas / Non réponse	45.0	33.4	75 000	45.1	33.5	75 500
Votre <u>E</u> ntourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?						
Oui	75.2	63.8	36 200	75.3	63.9	36 600
Non	42.8	34.6	223 500	42.8	34.6	224 800
Ne sait pas / Non réponse	45.0	33.2	73 600	45.1	33.2	74 000
Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez <u>T</u> rop ?						
Oui	75.3	63.0	46 000	75.4	63.1	46 400
Non	41.3	33.3	213 100	41.2	33.3	214 300
Ne sait pas / Non réponse	45.2	33.5	74 200	45.2	33.6	74 700
Avez-vous déjà eu besoin d' <u>A</u> lcool le matin pour vous sentir en forme ?						
Oui	75.0	71.3	15 800	75.3	71.3	16 000
Non	45.6	36.5	244 700	45.6	36.6	246 200
Ne sait pas / Non réponse	44.8	33.1	72 800	44.9	33.2	73 200
RESULTAT DU TEST DETA						
Problème avec l'alcool passé ou						
présent	76.3	65.1	43 000	76.4	65.1	43 400
Patient réputé indemne	41.5	33.3	216 000	41.4	33.3	217 200
Patient inclassable	45.3	33.6	74 300	45.4	33.6	74 800
PROBLEME AVEC L'ALCOOL SELON LE MEDECIN						
Oui	73.7	68.5	34 700	73.8	68.5	35 100
Non	42.8	33.4	250 900	42.8	33.4	252 300
Ne sait pas / Non réponse	48.6	36.4	47 700	48.6	36.4	48 000
SIGNES DE DEPENDANCE PHYSIQUE SELON LE MEDECIN						
Sans objet	42.8	33.4	250 900	42.8	33.4	252 300
Oui	73.7	77.5	14 600	73.9	77.5	14 800
Non	71.4	55.7	22 600	71.4	55.7	22 800
Ne sait pas / Non réponse	48.3	38.1	45 200	48.3	38.1	45 500
Ensemble des patients	46.8	37.4	333 300	46.9	37.5	335 400

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-13 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
HABITUDES TABAGIQUES										
Non fumeur	37.9	13.4	8.7	11.7	32.6	37.9	13.5	8.7	11.8	32.6
Ex fumeur	18.4	28.0	14.1	23.0	19.3	18.4	28.0	14.0	22.9	19.3
Fumeur occasionnel	3.5	5.1	3.4	4.5	3.7	3.5	5.1	3.4	4.5	3.7
Fumeur régulier	12.9	37.0	55.6	43.7	19.2	12.9	37.0	55.6	43.8	19.2
Dont fumant quotidiennement										
1 à 5 cigarettes	1.4	2.8	2.4	2.7	1.7	1.4	2.8	2.5	2.7	1.7
6 à 20 cigarettes	9.3	25.7	31.5	27.8	13.1	9.3	25.7	31.6	27.9	13.1
21 à 40 cigarettes	1.5	6.8	17.9	10.8	3.4	1.6	6.8	17.8	10.8	3.4
plus de 40 cigarettes	0.1	0.7	2.1	1.2	0.3	0.1	0.7	2.1	1.2	0.3
non réponse	0.5	1.0	1.6	1.2	0.6	0.5	1.0	1.6	1.2	0.6
Patient inclassable	27.3	16.4	18.2	17.1	25.2	27.3	16.4	18.2	17.1	25.2
ABUS OU DEPENDANCE AUX PSYCHOTROPES (1)										
Oui	0.7	2.0	5.8	3.4	1.2	0.6	2.0	5.8	3.4	1.2
Non ou non réponse	99.3	98.0	94.2	96.6	98.8	99.4	98.0	94.2	96.6	98.8
ABUS OU DEPENDANCE AUX DROGUES ILLEGALES (1)										
Oui	0.4	2.3	4.2	3.0	0.9	0.4	2.3	4.2	3.0	0.9
Non ou non réponse	99.6	97.7	95.8	97.0	99.1	99.6	97.7	95.8	97.0	99.1
TABAC REGULIER OU PSYCHOTROPES OU DROGUES ILLEGALES										
Au moins un des trois (2)	13.4	37.7	56.8	44.6	19.7	13.4	37.8	56.8	44.7	19.8
Aucun des trois	30.7	25.9	16.7	22.6	29.0	30.6	25.9	16.6	22.5	29.0
Patient inclassable	55.9	36.4	26.5	32.8	51.2	56.0	36.4	26.6	32.8	51.3
Nombre de patients	265 800	43 100	24 400	67 500	333 300	267 300	43 400	24 700	68 100	335 400

(1) Mentionné par le médecin soit en motif de recours le jour de l'enquête, soit en autre problème de santé connu.

(2) Ce chiffre est inférieur à la somme des trois autres pris individuellement car un même patient peut cumuler plusieurs types de produits.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-14 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
HABITUDES TABAGIQUES										
Non fumeur	92.7	5.3	2.0	7.3	108 600	92.7	5.4	2.0	7.3	109 300
Ex fumeur	75.9	18.7	5.3	24.1	64 400	75.9	18.8	5.4	24.1	64 800
Fumeur occasionnel	75.6	17.7	6.6	24.4	12 300	75.5	17.8	6.7	24.5	12 400
Fumeur régulier	53.8	24.9	21.2	46.2	63 900	53.7	25.0	21.3	46.3	64 400
Dont fumant quotidiennement										
1 à 5 cigarettes	68.0	21.4	10.6	32.0	5 600	67.8	21.5	10.7	32.2	5 700
6 à 20 cigarettes	56.9	25.4	17.7	43.1	43 500	56.8	25.4	17.8	43.2	43 900
21 à 40 cigarettes	36.0	25.7	38.3	64.0	11 500	36.0	25.7	38.3	64.0	11 500
plus de 40 cigarettes	29.9	26.0	44.1	70.1	1 200	30.1	25.9	44.0	69.9	1 200
non réponse	60.9	20.9	18.2	39.1	2 100	61.0	20.8	18.2	39.0	2 100
Patient inclassable	86.3	8.4	5.3	13.7	84 100	86.2	8.4	5.3	13.8	84 500
ABUS OU DEPENDANCE AUX PSYCHOTROPES (1)										
Oui	43.0	21.7	35.3	57.0	4 000	43.0	21.7	35.3	57.0	4 000
Non ou non réponse	80.2	12.8	7.0	19.8	329 300	80.1	12.8	7.0	19.9	331 400
ABUS OU DEPENDANCE AUX DROGUES ILLEGALES (1)										
Oui	31.8	33.4	34.8	68.2	3 000	31.9	33.3	34.8	68.1	3 000
Non ou non réponse	80.2	12.7	7.1	19.8	330 300	80.1	12.8	7.1	19.9	332 400
TABAC REGULIER OU PSYCHOTROPES OU DROGUES ILLEGALES										
Au moins un des trois (2)	54.2	24.7	21.1	45.8	65 700	54.1	24.7	21.2	45.9	66 300
Aucun des trois	84.3	11.5	4.2	15.7	96 800	84.2	11.5	4.2	15.8	97 200
Patient inclassable	87.0	9.2	3.8	13.0	170 800	87.0	9.2	3.8	13.0	171 900
Ensemble des patients	79.8	12.9	7.3	20.2	333 300	79.7	12.9	7.4	20.3	335 400

(1) Mentionné par le médecin soit en motif de recours le jour de l'enquête, soit en autre problème de santé connu.

(2) Ce chiffre est inférieur à la somme des trois autres pris individuellement car un même patient peut cumuler plusieurs types de produits.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-15 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
HABITUDES TABAGIQUES						
Non fumeur	24.6	28.7	108 600	24.5	28.7	109 300
Ex fumeur	71.3	35.7	64 400	71.2	35.8	64 800
Fumeur occasionnel	51.7	50.3	12 300	51.7	50.3	12 400
Fumeur régulier	64.9	59.0	63 900	65.0	59.0	64 400
Dont fumant quotidiennement						
1 à 5 cigarettes	57.3	43.3	5 600	57.3	43.5	5 700
6 à 20 cigarettes	63.5	56.9	43 500	63.6	57.0	43 900
21 à 40 cigarettes	69.9	72.7	11 500	69.9	72.7	11 500
plus de 40 cigarettes	83.4	74.3	1 200	83.4	74.3	1 200
non réponse	75.7	60.5	2 100	75.5	60.3	2 100
Patient inclassable	42.5	31.9	84 100	42.5	31.9	84 500
ABUS OU DEPENDANCE AUX PSYCHOTROPES (1)						
Oui	52.5	59.0	4 000	52.6	58.9	4 000
Non ou non réponse	46.8	37.2	329 300	46.8	37.3	331 400
ABUS OU DEPENDANCE AUX DROGUES ILLEGALES (1)						
Oui	70.4	33.0	3 000	70.5	33.0	3 000
Non ou non réponse	46.6	37.5	330 300	46.6	37.5	332 400
TABAC REGULIER OU PSYCHOTROPES OU DROGUES ILLEGALES						
Au moins un des trois (2)	64.2	58.7	65 700	64.3	58.7	66 300
Aucun des trois	43.9	29.1	96 800	43.9	29.2	97 200
Patient inclassable	41.8	34.0	170 800	41.8	34.1	171 900
Ensemble des patients	46.8	37.4	333 300	46.9	37.5	335 400

(1) Mentionné par le médecin soit en motif de recours le jour de l'enquête, soit en autre problème de santé connu.

(2) Ce chiffre est inférieur à la somme des trois autres pris individuellement car un même patient peut cumuler plusieurs types de produits.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-16 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive
et la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL EN MEDECINE GENERALE										
Prise en charge passée	0.0	7.1	19.7	11.7	2.4	0.0	7.1	19.7	11.6	2.4
Prise en charge en cours	0.0	2.3	11.5	5.6	1.1	0.0	2.3	11.5	5.6	1.1
Prise en charge proposée	0.0	3.5	7.6	5.0	1.0	0.0	3.5	7.7	5.0	1.0
Sans objet	100.0	37.8	4.1	25.6	84.9	100.0	37.7	4.1	25.5	84.9
Ne sait pas / Non réponse	0.0	49.3	57.1	52.1	10.5	0.0	49.3	57.1	52.1	10.6
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE STRUCTURE SPECIALISEE										
Prise en charge passée	0.0	4.4	11.6	7.0	1.4	0.0	4.4	11.6	7.0	1.4
Prise en charge en cours	0.0	5.3	28.4	13.6	2.8	0.0	5.2	28.3	13.6	2.8
Prise en charge proposée	0.0	3.8	9.3	5.8	1.2	0.0	3.8	9.4	5.8	1.2
Sans objet	100.0	37.3	4.2	25.3	84.9	100.0	37.2	4.2	25.2	84.8
Ne sait pas / Non réponse	0.0	49.3	46.5	48.3	9.8	0.0	49.4	46.5	48.3	9.8
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE ASSOCIATION D'ANCIENS BUVEURS										
Prise en charge passée	0.0	1.8	5.6	3.2	0.6	0.0	1.8	5.6	3.2	0.6
Prise en charge en cours	0.0	0.4	3.6	1.6	0.3	0.0	0.4	3.6	1.6	0.3
Prise en charge proposée	0.0	3.4	18.0	8.7	1.8	0.0	3.4	18.0	8.7	1.8
Sans objet	100.0	37.9	4.3	25.7	85.0	100.0	37.9	4.2	25.7	84.9
Ne sait pas / Non réponse	0.0	56.5	68.6	60.9	12.3	0.0	56.5	68.6	60.9	12.4
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE										
Patients ayant bénéficié d'au moins une prise en charge passée, en cours ou proposée (1)	0.0	20.8	64.4	36.6	7.4	0.0	20.8	64.4	36.6	7.4
Patients pour lesquels la réponse est "sans objet" (2)	100.0	37.1	4.1	25.1	84.8	100.0	37.0	4.1	25.1	84.8
Patients pour lesquels il n'y a pas de réponse (3)	0.0	42.1	31.5	38.3	7.8	0.0	42.2	31.6	38.3	7.8
Nombre de patients	265 800	43 100	24 400	67 500	333 300	267 300	43 400	24 700	68 100	335 400

(1) Ce chiffre est inférieur à la somme des prises en charge prises individuellement car un même patient peut bénéficier de plusieurs types de prise en charge.

(2) Pour les patients classés à risque d'alcoolisation excessive, il s'agit de patients jugés sans problème d'alcool par le médecin mais classés à risque par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool.

(3) Inclut les patients n'ayant jamais fait l'objet d'une prise en charge spécifique.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-17 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées**

	France métropolitaine					France métropolitaine + La Réunion				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL EN MEDECINE GENERALE										
Prise en charge passée	0.0	38.8	61.2	100.0	7 900	0.0	38.8	61.2	100.0	7 900
Prise en charge en cours	0.0	26.2	73.8	100.0	3 800	0.0	26.3	73.7	100.0	3 900
Prise en charge proposée	0.0	44.9	55.1	100.0	3 400	0.0	44.8	55.2	100.0	3 400
Sans objet	93.9	5.7	0.4	6.1	283 100	93.9	5.8	0.4	6.1	284 700
Ne sait pas / Non réponse	0.0	60.4	39.6	100.0	35 100	0.0	60.3	39.7	100.0	35 500
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE STRUCTURE SPECIALISEE										
Prise en charge passée	0.0	40.0	60.0	100.0	4 700	0.0	40.0	60.0	100.0	4 800
Prise en charge en cours	0.0	24.6	75.4	100.0	9 200	0.0	24.5	75.5	100.0	9 300
Prise en charge proposée	0.0	41.6	58.4	100.0	3 900	0.0	41.4	58.6	100.0	3 900
Sans objet	94.0	5.7	0.4	6.0	282 900	94.0	5.7	0.4	6.0	284 500
Ne sait pas / Non réponse	0.0	65.2	34.8	100.0	32 600	0.0	65.1	34.9	100.0	32 900
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE ASSOCIATION D'ANCIENS BUVEURS										
Prise en charge passée	0.0	36.0	64.0	100.0	2 100	0.0	36.1	63.9	100.0	2 100
Prise en charge en cours	0.0	16.7	83.3	100.0	1 100	0.0	16.7	83.3	100.0	1 100
Prise en charge proposée	0.0	24.9	75.1	100.0	5 800	0.0	24.9	75.1	100.0	5 900
Sans objet	93.9	5.8	0.4	6.1	283 200	93.9	5.8	0.4	6.1	284 800
Ne sait pas / Non réponse	0.0	59.2	40.8	100.0	41 100	0.0	59.1	40.9	100.0	41 500
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE										
Patients ayant bénéficié d'au moins une prise en charge passée, en cours ou proposée (1)	0.0	36.3	63.7	100.0	24 700	0.0	36.2	63.8	100.0	24 900
Patients pour lesquels la réponse est "sans objet" (2)	94.0	5.6	0.4	6.0	282 800	94.0	5.6	0.4	6.0	284 400
Patients pour lesquels il n'y a pas de réponse (3)	0.0	70.2	29.8	100.0	25 800	0.0	70.1	29.9	100.0	26 100
Ensemble des patients	79.8	12.9	7.3	20.2	333 300	79.7	12.9	7.4	20.3	335 400

(1) Ce chiffre est inférieur à la somme des prises en charge prises individuellement car un même patient peut bénéficier de plusieurs types de prise en charge.

(2) Pour les patients classés à risque d'alcoolisation excessive, il s'agit de patients jugés sans problème d'alcool par le médecin mais classés à risque par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool.

(3) Inclut les patients n'ayant jamais fait l'objet d'une prise en charge spécifique.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

Enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-18 : Principales caractéristiques démographiques des patients
âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000
selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées**

	France métropolitaine			France métropolitaine + La Réunion		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL EN MEDECINE GENERALE						
Prise en charge passée	73.7	72.7	7 900	73.8	72.7	7 900
Prise en charge en cours	68.2	74.7	3 800	68.4	74.6	3 900
Prise en charge proposée	77.0	68.4	3 400	77.3	68.1	3 400
Sans objet	41.8	32.6	283 100	41.8	32.7	284 700
Ne sait pas / Non réponse	76.4	61.4	35 100	76.5	61.5	35 500
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE STRUCTURE SPECIALISEE						
Prise en charge passée	76.2	76.1	4 700	76.4	76.2	4 800
Prise en charge en cours	67.2	79.2	9 200	67.4	79.1	9 300
Prise en charge proposée	77.8	67.1	3 900	78.1	67.3	3 900
Sans objet	41.8	32.6	282 900	41.7	32.7	284 500
Ne sait pas / Non réponse	77.3	58.5	32 600	77.3	58.5	32 900
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE ASSOCIATION D'ANCIENS BUVEURS						
Prise en charge passée	74.5	79.3	2 100	74.6	79.3	2 100
Prise en charge en cours	61.7	75.3	1 100	61.8	75.3	1 100
Prise en charge proposée	74.3	76.9	5 800	74.5	76.9	5 900
Sans objet	41.8	32.7	283 200	41.8	32.7	284 800
Ne sait pas / Non réponse	75.9	61.7	41 100	75.9	61.7	41 500
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE						
Patients ayant bénéficié d'au moins une prise en charge passée, en cours ou proposée (1)	72.5	73.4	24 700	72.7	73.4	24 900
Patients pour lesquels la réponse est "sans objet" (2)	41.7	32.6	282 800	41.7	32.6	284 400
Patients pour lesquels il n'y a pas de réponse (3)	78.2	56.4	25 800	78.2	56.4	26 100
Ensemble des patients	46.8	37.4	333 300	46.9	37.5	335 400

(1) Ce chiffre est inférieur à la somme des prises en charge prises individuellement car un même patient peut bénéficier de plusieurs types de prise en charge.

(2) Pour les patients classés à risque d'alcoolisation excessive, il s'agit de patients jugés sans problème d'alcool par le médecin mais classés à risque par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool.

(3) Inclut les patients n'ayant jamais fait l'objet d'une prise en charge spécifique.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-19 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants
selon le sexe et la région d'hospitalisation**

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Hommes											
Alsace	9.8	11.4	21.1	23.5	27.7	23.4	6.2	17.8	19.7	18.5	4 600
Aquitaine	34.3	21.7	25.3	14.5	21.2	16.2	9.9	4.1	16.4	18.3	8 300
Auvergne	19.9	20.9	18.2	14.4	14.8	18.5	11.2	8.1	15.6	16.1	3 800
Basse-Normandie	44.0	35.1	27.9	29.3	25.6	23.6	12.2	14.3	24.7	26.2	3 400
Bourgogne	19.6	8.1	26.3	27.1	27.9	23.1	11.2	3.3	20.3	19.9	4 300
Bretagne	21.4	26.1	26.1	30.1	36.0	24.6	14.4	12.7	24.8	25.1	8 800
Centre	29.6	24.9	30.3	31.5	28.7	14.3	9.6	7.4	21.6	22.5	6 600
Champagne-Ardenne	27.2	32.5	28.8	13.0	34.6	27.3	15.7	10.3	23.1	24.3	3 300
Corse	37.5	25.3	37.3	20.6	37.7	28.6	8.1	14.1	24.2	26.3	800
Franche-Comté	10.6	27.1	16.5	24.7	28.8	24.4	16.1	10.2	21.4	21.3	2 700
Haute-Normandie	50.7	41.2	20.8	21.6	41.7	19.7	11.3	7.9	25.4	26.2	3 500
Ile-de-France	14.9	27.0	20.4	26.0	30.4	20.0	11.3	9.9	21.0	21.1	31 200
Languedoc-Roussillon	34.1	38.8	25.5	25.1	19.8	15.0	6.1	2.2	19.5	21.1	7 000
Limousin	27.3	24.7	23.1	24.5	25.5	18.9	10.3	7.2	19.2	20.7	2 300
Lorraine	36.7	33.3	28.4	27.8	22.8	19.4	13.9	9.5	23.3	24.1	6 900
Midi-Pyrénées	41.9	29.9	27.4	28.9	26.3	10.7	6.4	4.2	19.9	21.7	7 200
Nord-Pas-de-Calais	18.9	26.0	24.3	21.4	35.8	21.6	12.2	9.9	22.5	22.3	8 600
Pays-de-la-Loire	38.7	39.2	15.9	30.3	25.3	23.6	18.6	4.5	24.4	25.0	7 600
Picardie	27.3	23.7	19.1	26.1	26.3	26.9	15.9	8.0	22.8	22.6	4 100
Poitou-Charentes	16.4	30.4	31.5	27.7	22.5	18.3	16.4	9.9	21.8	22.8	3 900
Provence-Alpes-Côte d'Azur	28.2	23.1	15.6	21.5	28.2	12.5	13.3	8.1	18.1	18.8	13 500
Rhône-Alpes	31.2	21.2	17.6	27.5	29.7	18.2	9.9	4.7	20.6	20.5	13 700
France métropolitaine	26.2	26.8	22.3	25.1	28.4	19.2	11.7	8.1	21.0	21.6	156 100
La Réunion	35.1	19.7	22.9	33.1	35.0	26.9	26.1	8.3	28.1	26.8	1 000
Ensemble	26.3	26.8	22.3	25.2	28.5	19.2	11.7	8.1	21.1		157 100
Femmes											
Alsace	14.6	5.7	4.9	6.3	3.2	4.4	1.8	1.1	4.0	4.9	5 300
Aquitaine	10.7	8.1	11.5	12.2	7.1	1.6	2.2	0.8	5.5	6.9	9 000
Auvergne	7.4	7.5	7.3	5.8	1.8	1.3	1.1	0.6	3.1	4.1	4 000
Basse-Normandie	1.7	1.9	6.9	7.6	11.6	6.2	2.5	1.7	4.9	5.6	3 700
Bourgogne	2.1	6.1	13.2	11.3	4.0	2.9	3.1	2.3	5.4	6.1	5 000
Bretagne	16.2	7.4	17.2	13.4	8.2	6.7	1.1	1.2	6.4	9.1	9 000
Centre	10.0	8.1	6.9	2.4	13.8	8.7	0.6	5.7	6.1	6.9	6 000
Champagne-Ardenne	0.0	7.3	17.4	4.5	7.5	3.0	3.0	0.0	5.0	6.0	3 100
Corse	21.1	1.3	15.7	4.9	5.3	4.5	1.6	0.0	5.1	6.3	900
Franche-Comté	3.4	5.6	10.9	4.5	8.5	6.5	1.9	2.0	5.0	5.8	3 200
Haute-Normandie	11.9	3.1	14.7	9.2	6.5	0.0	0.8	5.8	5.1	6.1	4 400
Ile-de-France	6.3	6.5	9.1	14.3	9.8	5.9	1.2	2.1	6.1	7.4	37 300
Languedoc-Roussillon	17.1	6.0	8.3	11.7	6.1	4.8	2.2	1.2	5.5	7.0	7 800
Limousin	18.8	1.0	10.6	9.3	4.3	3.6	3.0	0.0	4.3	6.0	2 400
Lorraine	6.0	5.0	9.4	4.6	3.9	5.2	0.0	0.4	3.8	4.6	7 400
Midi-Pyrénées	8.5	9.7	10.9	14.6	10.2	3.0	1.9	1.7	6.5	7.9	8 500
Nord-Pas-de-Calais	2.3	4.9	10.9	17.6	22.0	6.8	3.1	2.1	8.8	9.7	10 000
Pays-de-la-Loire	11.0	5.4	3.8	11.1	6.9	4.4	1.2	1.8	4.9	5.7	8 400
Picardie	1.9	6.0	7.4	13.6	16.3	4.6	0.0	1.1	5.5	7.1	4 700
Poitou-Charentes	10.1	12.1	12.9	2.7	6.2	5.7	2.0	0.9	5.5	6.6	4 100
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3.2	5.1	10.6	13.2	5.7	5.4	3.9	2.3	6.0	6.8	16 600
Rhône-Alpes	10.1	7.4	6.2	13.1	9.8	5.1	2.1	1.5	6.0	7.2	16 400
France métropolitaine	7.8	6.3	9.7	11.6	8.8	4.9	1.8	1.8	5.8	6.9	177 200
La Réunion	4.3	5.8	4.7	9.2	7.9	4.3	3.6	0.0	5.3	5.4	1 100
Ensemble	7.8	6.3	9.6	11.5	8.8	4.9	1.8	1.8	5.8		178 300

... / ...

**Tableau I-19 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants
selon le sexe et la région d'hospitalisation (suite et fin)**


Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standar- disée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Les deux sexes											
Alsace	12.1	7.7	12.6	15.2	16.9	14.7	3.4	6.5	11.3	11.7	9 900
Aquitaine	21.6	14.0	18.4	13.4	14.6	10.3	5.4	1.9	10.7	12.6	17 300
Auvergne	14.0	13.2	13.4	10.8	9.2	10.3	5.4	2.7	9.2	10.2	7 800
Basse-Normandie	16.3	16.8	18.3	19.0	20.5	14.8	6.7	5.3	14.4	15.4	7 100
Bourgogne	11.1	6.7	19.1	19.8	18.5	13.4	6.8	2.5	12.3	13.3	9 300
Bretagne	19.6	16.8	22.7	24.3	23.6	15.8	6.1	3.8	15.5	17.5	17 800
Centre	19.2	14.8	19.9	20.6	23.9	12.0	4.6	6.3	14.2	15.6	12 600
Champagne-Ardenne	15.7	17.3	23.5	10.0	24.4	16.4	8.8	3.7	14.5	15.8	6 400
Corse	27.4	13.9	23.7	13.3	22.1	17.3	4.5	5.3	14.4	16.1	1 700
Franche-Comté	7.1	11.9	14.1	15.2	20.8	15.5	7.7	4.4	12.6	13.2	5 900
Haute-Normandie	29.0	14.0	18.0	15.8	25.6	8.9	5.4	6.0	14.0	14.9	7 900
Ile-de-France	10.1	14.2	14.9	20.0	22.6	13.3	5.1	4.2	12.9	14.1	68 500
Languedoc-Roussillon	26.1	20.6	18.8	19.3	13.2	9.9	3.8	1.4	12.1	14.2	14 800
Limousin	23.5	11.6	17.1	18.5	15.5	11.7	6.1	2.4	11.6	13.6	4 700
Lorraine	19.3	18.0	19.7	18.0	14.2	12.8	5.6	3.0	13.3	14.3	14 300
Midi-Pyrénées	28.1	19.4	18.5	22.1	18.3	6.5	3.9	2.4	12.6	14.8	15 700
Nord-Pas-de-Calais	9.0	13.6	18.1	19.9	28.6	13.7	6.6	4.0	15.1	15.4	18 600
Pays-de-la-Loire	25.1	17.5	10.9	23.2	16.0	13.1	9.0	2.5	14.2	15.0	16 000
Picardie	11.9	13.4	13.8	21.2	22.3	15.3	5.6	3.1	13.7	14.4	8 800
Poitou-Charentes	13.7	20.2	22.8	17.2	15.6	12.6	7.7	4.2	13.5	15.0	8 000
Provence-Alpes-Côte d'Azur	16.3	12.5	13.3	17.9	16.3	8.6	7.7	3.8	11.4	12.4	30 100
Rhône-Alpes	20.9	13.6	11.8	21.1	20.1	11.8	4.7	2.3	12.7	13.7	30 100
France métropolitaine	16.9	14.7	16.4	19.1	19.7	12.2	5.8	3.6	12.9	14.1	333 300
La Réunion	13.1	10.8	13.7	25.3	25.1	15.8	13.6	2.7	16.6	16.3	2 100
Ensemble	16.8	14.7	16.3	19.2	19.8	12.2	5.8	3.6	12.9		335 400

(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Carte I-1 : Proportion standardisée (1) de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation



(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-20 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés alcoolo-dépendants
selon le sexe et la région d'hospitalisation**

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Hommes											
Alsace	8.0	27.5	17.9	21.7	14.3	7.3	5.1	0.0	12.3	13.9	4 600
Aquitaine	5.1	9.8	18.3	23.2	8.4	1.6	6.9	1.9	9.1	10.3	8 300
Auvergne	4.3	17.6	35.2	34.0	21.7	11.8	4.9	2.7	18.1	18.6	3 800
Basse-Normandie	26.4	21.0	15.8	27.6	17.5	7.2	1.9	2.3	14.1	15.1	3 400
Bourgogne	12.4	19.6	25.1	27.9	20.2	4.1	4.1	2.9	13.7	15.4	4 300
Bretagne	9.6	17.0	27.2	39.5	14.3	6.3	6.5	2.9	17.2	16.9	8 800
Centre	12.4	18.3	39.3	33.1	12.6	9.5	4.8	0.0	17.0	17.9	6 600
Champagne-Ardenne	2.1	21.7	13.8	29.5	5.6	7.9	1.1	0.0	11.4	11.7	3 300
Corse	0.0	7.2	23.9	27.9	18.9	10.3	0.0	0.0	12.2	13.0	800
Franche-Comté	8.9	9.6	30.9	33.3	14.5	6.4	2.0	3.2	14.5	14.9	2 700
Haute-Normandie	0.0	3.1	24.8	26.6	10.6	12.3	1.1	2.6	12.3	11.9	3 500
Ile-de-France	1.0	5.5	22.4	20.3	8.3	3.4	3.6	1.9	9.1	9.4	31 200
Languedoc-Roussillon	3.6	9.8	24.7	30.2	12.9	2.3	2.5	6.8	12.6	12.6	7 000
Limousin	8.0	23.5	28.2	26.5	11.8	8.7	2.2	1.9	13.0	15.2	2 300
Lorraine	4.7	4.1	19.3	19.8	17.3	3.2	2.4	4.0	10.3	10.1	6 900
Midi-Pyrénées	1.3	17.3	23.5	14.7	9.6	7.1	1.5	1.0	9.7	10.7	7 200
Nord-Pas-de-Calais	8.2	6.0	29.6	23.9	16.0	8.0	4.5	3.5	14.8	13.6	8 600
Pays-de-la-Loire	3.2	10.4	29.4	20.4	21.9	11.5	3.3	0.2	14.4	14.3	7 600
Picardie	7.4	14.4	18.0	19.1	10.5	6.6	4.5	4.7	11.6	11.3	4 100
Poitou-Charentes	2.6	15.7	23.7	28.1	12.8	6.0	4.3	0.0	12.1	13.2	3 900
Provence-Alpes-Côte d'Azur	9.6	18.1	26.1	22.3	10.9	1.0	4.5	3.1	11.9	12.5	13 500
Rhône-Alpes	5.1	9.8	15.3	14.3	10.8	5.1	5.3	3.5	9.1	9.3	13 700
France métropolitaine	5.3	11.8	23.9	23.7	12.2	5.4	3.9	2.3	11.9	12.2	156 100
La Réunion	8.8	23.6	31.8	30.9	21.3	13.8	6.8	4.2	22.3	19.4	1 000
Ensemble	5.3	11.9	24.0	23.8	12.3	5.5	3.9	2.3	12.0		157 100
Femmes											
Alsace	3.0	4.1	8.6	7.8	5.0	0.9	0.7	0.0	3.2	4.1	5 300
Aquitaine	2.5	7.6	7.6	9.5	3.6	0.9	1.2	0.4	3.7	4.5	9 000
Auvergne	0.0	5.8	11.9	12.6	7.8	3.6	0.7	0.2	4.7	6.2	4 000
Basse-Normandie	5.2	9.7	4.0	9.8	1.4	0.8	0.4	0.0	3.4	4.1	3 700
Bourgogne	0.0	3.6	14.2	7.6	1.2	2.2	0.7	0.0	3.5	4.3	5 000
Bretagne	5.6	6.7	7.9	12.3	9.9	1.9	1.6	0.8	4.4	6.2	9 000
Centre	0.0	5.5	12.3	10.7	6.1	0.0	2.5	0.0	4.2	5.3	6 000
Champagne-Ardenne	0.0	1.6	5.8	11.6	2.4	1.8	1.1	0.0	2.8	3.6	3 100
Corse	0.0	4.0	2.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	900
Franche-Comté	0.0	6.1	5.1	10.0	1.4	4.1	0.0	0.0	3.4	4.0	3 200
Haute-Normandie	0.0	2.6	6.0	5.9	1.9	2.4	0.6	0.9	2.4	2.9	4 400
Ile-de-France	0.0	1.8	6.8	7.5	7.5	2.0	0.1	0.6	2.9	3.8	37 300
Languedoc-Roussillon	1.1	10.6	11.1	14.5	4.7	0.5	0.5	0.0	4.4	6.0	7 800
Limousin	0.0	1.0	7.3	12.0	4.7	0.0	0.0	0.0	2.4	3.7	2 400
Lorraine	1.4	4.0	10.0	7.3	3.6	0.7	0.3	0.0	3.0	3.8	7 400
Midi-Pyrénées	2.8	0.6	4.8	6.8	1.8	0.9	0.4	0.2	2.0	2.5	8 500
Nord-Pas-de-Calais	2.0	4.5	7.7	11.3	7.2	2.1	1.3	0.0	4.3	5.1	10 000
Pays-de-la-Loire	4.2	2.5	6.5	7.5	2.5	2.1	0.0	0.0	2.6	3.4	8 400
Picardie	0.0	2.2	3.7	10.7	1.9	3.6	1.1	0.9	3.1	3.6	4 700
Poitou-Charentes	3.5	0.7	10.2	12.5	11.9	1.0	0.0	0.0	3.8	5.5	4 100
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.0	5.6	8.0	9.1	4.4	2.6	1.4	1.3	3.8	4.6	16 600
Rhône-Alpes	1.0	2.0	6.5	6.5	2.3	0.9	0.9	0.0	2.3	2.8	16 400
France métropolitaine	1.3	3.8	7.7	8.9	4.8	1.7	0.7	0.4	3.3	4.1	177 200
La Réunion	3.6	1.3	4.1	9.2	4.4	2.9	0.9	2.1	3.5	3.8	1 100
Ensemble	1.3	3.8	7.6	9.0	4.8	1.7	0.7	0.4	3.3		178 300

... / ...

**Tableau I-20 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés alcoolo-dépendants
selon le sexe et la région d'hospitalisation (suite et fin)**


Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Les deux sexes											
Alsace	5.7	12.3	13.0	15.0	10.2	4.4	2.3	0.0	7.4	8.6	9 900
Aquitaine	3.5	8.6	12.9	16.1	6.2	1.4	3.6	0.9	6.2	7.3	17 300
Auvergne	2.2	10.7	24.8	25.1	15.7	7.9	2.5	1.0	11.2	12.8	7 800
Basse-Normandie	12.5	14.6	10.4	19.2	11.6	4.0	1.0	0.6	8.5	9.6	7 100
Bourgogne	6.4	8.6	19.1	18.5	12.7	3.2	2.3	0.7	8.2	9.7	9 300
Bretagne	8.1	11.9	19.9	30.1	12.4	4.1	3.5	1.3	10.7	12.5	17 800
Centre	5.9	10.6	27.4	24.7	10.5	5.7	3.6	0.0	10.9	12.4	12 600
Champagne-Ardenne	1.2	9.5	10.1	23.3	4.4	5.2	1.1	0.0	7.3	8.0	6 400
Corse	0.0	5.7	11.2	19.6	9.8	5.5	0.0	0.0	6.7	7.6	1 700
Franche-Comté	4.6	7.1	19.2	22.2	9.3	5.2	0.8	0.9	8.6	9.7	5 900
Haute-Normandie	0.0	2.7	16.2	17.1	6.6	6.8	0.8	1.2	6.7	7.6	7 900
Ile-de-France	0.5	3.2	14.8	13.8	8.0	2.7	1.4	1.0	5.7	6.5	68 500
Languedoc-Roussillon	2.5	10.2	19.5	23.4	9.0	1.4	1.4	1.7	8.3	9.6	14 800
Limousin	4.6	11.3	18.0	20.6	8.5	4.6	0.9	0.6	7.6	9.6	4 700
Lorraine	2.8	4.1	15.0	14.5	11.1	2.1	1.1	1.1	6.5	7.2	14 300
Midi-Pyrénées	1.9	8.6	13.5	10.9	5.7	3.7	0.9	0.4	5.5	6.4	15 700
Nord-Pas-de-Calais	4.4	5.1	19.3	19.0	11.4	4.8	2.5	0.8	9.2	9.4	18 600
Pays-de-la-Loire	3.7	5.2	20.0	15.6	12.1	6.3	1.5	0.1	8.2	9.1	16 000
Picardie	2.9	7.2	11.4	15.8	7.1	5.1	2.3	2.0	7.1	7.5	8 800
Poitou-Charentes	3.0	7.3	17.4	21.5	12.4	3.6	1.7	0.0	7.9	9.5	8 000
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5.0	10.7	17.7	16.5	7.4	1.9	2.7	1.7	7.5	8.6	30 100
Rhône-Alpes	3.0	5.5	10.9	10.8	6.7	3.1	2.4	0.9	5.4	5.9	30 100
France métropolitaine	3.2	7.1	16.3	17.2	8.9	3.6	2.0	0.9	7.3	8.3	333 300
La Réunion	4.5	9.1	18.3	23.9	15.1	8.4	4.0	2.7	12.8	12.0	2 100
Ensemble	3.3	7.1	16.3	17.2	9.0	3.6	2.0	0.9	7.4		335 400

(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Carte I-2 : Proportion standardisée (1) de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés alcoolo-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation



(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau I-21 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon le sexe et la région d'hospitalisation**

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Hommes											
Alsace	17.8	38.9	38.9	45.2	41.9	30.8	11.3	17.8	32.0	32.4	4 600
Aquitaine	39.4	31.6	43.6	37.7	29.6	17.8	16.8	6.0	25.5	28.5	8 300
Auvergne	24.2	38.5	53.4	48.4	36.5	30.2	16.0	10.8	33.7	34.7	3 800
Basse-Normandie	70.3	56.1	43.7	56.9	43.1	30.8	14.1	16.6	38.7	41.3	3 400
Bourgogne	32.0	27.7	51.3	54.9	48.0	27.2	15.4	6.2	34.0	35.3	4 300
Bretagne	31.0	43.1	53.3	69.5	50.3	30.9	21.0	15.6	42.0	42.0	8 800
Centre	41.9	43.2	69.7	64.5	41.3	23.7	14.4	7.4	38.6	40.4	6 600
Champagne-Ardenne	29.2	54.2	42.6	42.5	40.2	35.3	16.8	10.3	34.5	36.1	3 300
Corse	37.5	32.5	61.2	48.5	56.6	38.9	8.1	14.1	36.4	39.3	800
Franche-Comté	19.5	36.7	47.4	58.1	43.3	30.8	18.1	13.4	35.9	36.3	2 700
Haute-Normandie	50.7	44.3	45.6	48.2	52.2	32.0	12.4	10.6	37.8	38.1	3 500
Ile-de-France	16.0	32.5	42.9	46.3	38.7	23.4	14.9	11.7	30.1	30.6	31 200
Languedoc-Roussillon	37.7	48.6	50.2	55.3	32.8	17.3	8.6	8.9	32.1	33.7	7 000
Limousin	35.2	48.2	51.3	51.0	37.3	27.5	12.5	9.1	32.2	35.9	2 300
Lorraine	41.4	37.4	47.6	47.6	40.1	22.6	16.2	13.6	33.6	34.2	6 900
Midi-Pyrénées	43.1	47.2	50.8	43.6	35.9	17.8	8.0	5.2	29.5	32.3	7 200
Nord-Pas-de-Calais	27.1	32.1	53.9	45.3	51.8	29.6	16.7	13.5	37.3	35.9	8 600
Pays-de-la-Loire	42.0	49.6	45.2	50.8	47.2	35.0	21.9	4.8	38.7	39.3	7 600
Picardie	34.7	38.0	37.1	45.2	36.8	33.5	20.4	12.7	34.4	33.9	4 100
Poitou-Charentes	19.0	46.1	55.1	55.8	35.3	24.3	20.7	9.9	33.9	36.1	3 900
Provence-Alpes-Côte d'Azur	37.8	41.1	41.8	43.8	39.1	13.5	17.8	11.2	30.0	31.3	13 500
Rhône-Alpes	36.3	31.1	33.0	41.8	40.5	23.3	15.2	8.2	29.8	29.8	13 700
France métropolitaine	31.5	38.7	46.3	48.8	40.6	24.6	15.6	10.4	33.0	33.8	156 100
La Réunion	43.9	43.3	54.7	64.0	56.3	40.7	33.0	12.5	50.4	46.2	1 000
Ensemble	31.6	38.7	46.3	49.0	40.8	24.6	15.7	10.4	33.1		157 100
Femmes											
Alsace	17.7	9.8	13.4	14.1	8.2	5.2	2.5	1.1	7.3	9.0	5 300
Aquitaine	13.2	15.7	19.1	21.8	10.7	2.6	3.4	1.1	9.2	11.4	9 000
Auvergne	7.4	13.4	19.1	18.4	9.5	5.0	1.8	0.8	7.8	10.2	4 000
Basse-Normandie	6.9	11.6	10.9	17.4	13.0	7.0	2.9	1.7	8.3	9.7	3 700
Bourgogne	2.1	9.8	27.4	18.9	5.1	5.1	3.9	2.3	8.9	10.4	5 000
Bretagne	21.8	14.0	25.1	25.8	18.1	8.6	2.7	2.0	10.8	15.3	9 000
Centre	10.0	13.6	19.2	13.1	19.9	8.7	3.1	5.7	10.2	12.2	6 000
Champagne-Ardenne	0.0	8.9	23.2	16.0	9.9	4.8	4.1	0.0	7.8	9.6	3 100
Corse	21.1	5.3	18.6	13.6	5.3	4.5	1.6	0.0	6.8	8.6	900
Franche-Comté	3.4	11.6	15.9	14.6	9.9	10.5	1.9	2.0	8.5	9.8	3 200
Haute-Normandie	11.9	5.7	20.7	15.1	8.4	2.4	1.4	6.7	7.5	9.0	4 400
Ile-de-France	6.3	8.3	16.0	21.8	17.3	7.9	1.3	2.7	9.0	11.2	37 300
Languedoc-Roussillon	18.3	16.6	19.4	26.1	10.8	5.3	2.7	1.2	9.9	13.0	7 800
Limousin	18.8	1.9	17.9	21.3	9.0	3.6	3.0	0.0	6.7	9.7	2 400
Lorraine	7.3	9.0	19.5	11.9	7.5	5.8	0.3	0.4	6.8	8.4	7 400
Midi-Pyrénées	11.4	10.4	15.7	21.4	12.0	4.0	2.3	1.8	8.5	10.4	8 500
Nord-Pas-de-Calais	4.3	9.4	18.6	28.8	29.2	8.9	4.4	2.1	13.1	14.8	10 000
Pays-de-la-Loire	15.1	7.9	10.3	18.6	9.4	6.4	1.2	1.8	7.5	9.1	8 400
Picardie	1.9	8.2	11.1	24.3	18.2	8.2	1.1	2.1	8.6	10.7	4 700
Poitou-Charentes	13.6	12.8	23.1	15.2	18.1	6.6	2.0	0.9	9.4	12.1	4 100
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3.2	10.7	18.5	22.4	10.1	8.0	5.3	3.5	9.8	11.4	16 600
Rhône-Alpes	11.1	9.3	12.7	19.6	12.1	6.0	2.9	1.5	8.3	10.0	16 400
France métropolitaine	9.1	10.1	17.3	20.5	13.7	6.6	2.6	2.2	9.0	11.0	177 200
La Réunion	7.9	7.1	8.8	18.3	12.3	7.1	4.5	2.1	8.9	9.2	1 100
Ensemble	9.1	10.1	17.2	20.5	13.7	6.6	2.6	2.2	9.0		178 300

**Tableau I-21 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés
un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive
selon le sexe et la région d'hospitalisation (suite et fin)**


Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Les deux sexes											
Alsace	17.8	20.0	25.6	30.2	27.1	19.1	5.7	6.5	18.7	20.3	9 900
Aquitaine	25.2	22.6	31.3	29.5	20.8	11.7	9.0	2.9	17.0	19.9	17 300
Auvergne	16.1	23.9	38.2	35.9	24.9	18.1	7.9	3.7	20.4	23.0	7 800
Basse-Normandie	28.8	31.5	28.7	38.3	32.1	18.8	7.7	5.9	22.9	25.1	7 100
Bourgogne	17.6	15.3	38.2	38.3	31.2	16.6	9.1	3.2	20.5	23.1	9 300
Bretagne	27.8	28.7	42.7	54.4	36.0	19.9	9.6	5.1	26.2	30.0	17 800
Centre	25.1	25.4	47.3	45.2	34.4	17.7	8.2	6.3	25.1	27.9	12 600
Champagne-Ardenne	16.9	26.8	33.6	33.4	28.8	21.6	9.8	3.7	21.8	23.8	6 400
Corse	27.4	19.6	34.9	32.9	31.9	22.8	4.5	5.3	21.1	23.7	1 700
Franche-Comté	11.6	19.0	33.3	37.3	30.1	20.7	8.6	5.3	21.2	22.9	5 900
Haute-Normandie	29.0	16.7	34.2	33.0	32.1	15.7	6.1	7.3	20.7	22.5	7 900
Ile-de-France	10.6	17.4	29.8	33.9	30.7	16.0	6.6	5.2	18.6	20.6	68 500
Languedoc-Roussillon	28.5	30.8	38.3	42.7	22.2	11.3	5.1	3.1	20.4	23.8	14 800
Limousin	28.1	23.0	35.2	39.2	24.0	16.3	7.1	3.1	19.2	23.2	4 700
Lorraine	22.1	22.1	34.7	32.6	25.4	14.9	6.7	4.1	19.8	21.5	14 300
Midi-Pyrénées	30.0	28.1	32.0	33.0	23.9	10.2	4.9	2.8	18.1	21.2	15 700
Nord-Pas-de-Calais	13.4	18.7	37.4	38.9	39.9	18.5	9.1	4.8	24.3	24.8	18 600
Pays-de-la-Loire	28.8	22.8	30.9	38.8	28.1	19.4	10.5	2.6	22.4	24.1	16 000
Picardie	14.9	20.6	25.2	37.0	29.3	20.3	7.9	5.1	20.8	21.9	8 800
Poitou-Charentes	16.7	27.6	40.1	38.6	28.0	16.2	9.4	4.2	21.4	24.5	8 000
Provence-Alpes-Côte d'Azur	21.3	23.2	30.9	34.4	23.8	10.4	10.4	5.5	18.9	20.9	30 100
Rhône-Alpes	24.0	19.1	22.7	31.9	26.8	14.9	7.1	3.2	18.1	19.7	30 100
France métropolitaine	20.1	21.8	32.6	36.3	28.7	15.7	7.8	4.5	20.2	22.4	333 300
La Réunion	17.7	19.8	32.0	49.2	40.2	24.2	17.6	5.5	29.4	28.3	2 100
Ensemble	20.1	21.8	32.6	36.4	28.8	15.8	7.8	4.5	20.3		335 400

(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Carte I-3 : Proportion standardisée (1) de patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation



(2) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau I-22 : Effet (1) des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 sur le risque d'alcoolisation excessive (2)

	Coefficients	Odds ratios		Coefficients	Odds ratios
Constante	-2.44	référence	HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12		
DISCIPLINE D'HOSPITALISATION			DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT		
Médecine	0.35	1.41	Oui	0.18	1.19
Chirurgie	référence	référence	Non	référence	référence
Gynécologie-Obstétrique	-0.99	0.37	NSP / NR	non significatif	non significatif
Soins de suite et réadaptation	0.35	1.42	AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES		
Psychiatrie	0.59	1.81	12 DERNIERS MOIS		
SEXE			Oui	0.34	1.41
Homme	1.44	4.23	Non	référence	référence
Femme	référence	référence	NSP / NR	0.14	1.15
AGE			PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE		
16 à 24 ans	-0.24	0.79	Oui	non significatif	non significatif
25 à 34 ans	référence	référence	Non	référence	référence
35 à 44 ans	0.36	1.44	NSP / NR	non significatif	non significatif
45 à 54 ans	0.54	1.72	EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE		
55 à 64 ans	0.20	1.22	AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)		
65 à 74 ans	-0.57	0.56	Oui	-0.09	0.92
75 à 84 ans	-1.28	0.28	Non	référence	référence
85 ans ou plus	-1.75	0.18	NSP / NR	non significatif	non significatif
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI			REGION		
Emploi stable	référence	référence	Ile-de-France	-0.39	0.68
Emploi précaire	0.62	1.86	Champagne-Ardenne	-0.24	0.79
Chômeur	0.99	2.69	Picardie	-0.30	0.74
Retraité	0.24	1.27	Haute-Normandie	-0.28	0.76
Au foyer	0.29	1.34	Centre	non significatif	non significatif
Autre	non significatif	non significatif	Basse-Normandie	non significatif	non significatif
NSP / NR	non significatif	non significatif	Bourgogne	-0.24	0.78
DOMICILE			Nord-Pas-de-Calais	non significatif	non significatif
Domicile stable	référence	référence	Lorraine	-0.40	0.67
Domicile précaire ou sans abri	0.26	1.29	Alsace	-0.37	0.69
NSP / NR	-0.22	0.80	Franche-Comté	non significatif	non significatif
SITUATION FAMILIALE			Pays-de-la-Loire	non significatif	non significatif
Seul sans enfants	0.47	1.59	Bretagne	référence	référence
Seul avec enfants	0.45	1.56	Poitou-Charentes	non significatif	non significatif
En couple sans enfants	0.21	1.23	Aquitaine	-0.50	0.61
En couple avec enfants	référence	référence	Midi-Pyrénées	-0.43	0.65
Avec d'autres membres de sa			Limousin	-0.31	0.74
ou en collectivité	non significatif	non significatif	Rhône-Alpes	-0.47	0.62
NSP / NR	0.22	1.25	Auvergne	///	///
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE			Languedoc-Roussillon	-0.31	0.74
MALADIE UNIVERSELLE (CMU)			Provence-Alpes-Côte-d'Azur	-0.44	0.64
RMI avec ou sans CMU	0.86	2.37	Corse	non significatif	non significatif
CMU sans RMI	0.27	1.31	Guadeloupe	///	///
Ni RMI ni CMU	référence	référence	Martinique	///	///
NSP / NR	non significatif	non significatif	Guyane	///	///
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)			La Réunion	non significatif	non significatif
Oui	-0.44	0.64			
Non	référence	référence			
NSP / NR	non significatif	non significatif			

(1) Analyse réalisée avec un modèle de type LOGIT.

(2) Inclut les patients alcoolo-dépendants.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau I-23 : Effet (1) des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus hospitalisés un jour donné en 2000 sur le risque d'alcool-dépendance

	Coefficients	Odds ratios		Coefficients	Odds ratios
Constante	-4.52	référence	HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT		
DISCIPLINE D'HOSPITALISATION			Oui	0.28	1.33
Médecine	1.08	2.94	Non	référence	référence
Chirurgie	référence	référence	NSP / NR	0.21	1.23
Gynécologie-Obstétrique	-1.61	0.20	AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS		
Soins de suite et réadaptation	1.03	2.81	Oui	0.37	1.45
Psychiatrie	1.45	4.28	Non	référence	référence
SEXE			NSP / NR	0.23	1.26
Homme	1.08	2.95	PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE		
Femme	référence	référence	Oui	non significatif	non significatif
AGE			Non	référence	référence
16 à 24 ans	-0.84	0.43	NSP / NR	non significatif	non significatif
25 à 34 ans	référence	référence	EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)		
35 à 44 ans	0.84	2.33	Oui	-0.40	0.67
45 à 54 ans	0.96	2.60	Non	référence	référence
55 à 64 ans	0.28	1.32	NSP / NR	non significatif	non significatif
65 à 74 ans	-0.63	0.53	REGION		
75 à 84 ans	-1.15	0.32	Ile-de-France	-0.50	0.61
85 ans ou plus	-1.95	0.14	Champagne-Ardenne	non significatif	non significatif
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI			Picardie	-0.39	0.68
Emploi stable	référence	référence	Haute-Normandie	-0.47	0.62
Emploi précaire	0.63	1.88	Centre	non significatif	non significatif
Chômeur	1.03	2.81	Basse-Normandie	non significatif	non significatif
Retraité	0.28	1.32	Bourgogne	non significatif	non significatif
Au foyer	0.28	1.32	Nord-Pas-de-Calais	non significatif	non significatif
Autre	non significatif	non significatif	Lorraine	-0.51	0.60
NSP / NR	non significatif	non significatif	Alsace	non significatif	non significatif
DOMICILE			Franche-Comté	non significatif	non significatif
Domicile stable	référence	référence	Pays-de-la-Loire	non significatif	non significatif
Domicile précaire ou sans abri	0.39	1.47	Bretagne	référence	référence
NSP / NR	non significatif	non significatif	Poitou-Charentes	non significatif	non significatif
SITUATION FAMILIALE			Aquitaine	-0.40	0.67
Seul sans enfants	0.66	1.93	Midi-Pyrénées	-0.62	0.54
Seul avec enfants	0.80	2.22	Limousin	non significatif	non significatif
En couple sans enfants	0.25	1.28	Rhône-Alpes	-0.63	0.53
En couple avec enfants	référence	référence	Auvergne	///	///
Avec d'autres membres de sa famille ou en collectivité	non significatif	non significatif	Languedoc-Roussillon	non significatif	non significatif
NSP / NR	0.39	1.47	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	-0.32	0.72
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)			Corse	non significatif	non significatif
RMI avec ou sans CMU	0.91	2.48	Guadeloupe	///	///
CMU sans RMI	0.28	1.32	Martinique	///	///
Ni RMI ni CMU	référence	référence	Guyane	///	///
NSP / NR	non significatif	non significatif	La Réunion	non significatif	non significatif
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)					
Oui	-0.37	0.69			
Non	référence	référence			
NSP / NR	0.26	1.29			

(1) Analyse réalisée avec un modèle de type LOGIT.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-1 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et le type d'acte ou le motif de recours

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
TYPE D'ACTE										
Consultation	76.4	79.9	68.1	76.6	76.5	76.8	80.1	68.5	76.9	76.8
Visite	19.6	15.5	27.3	18.7	19.4	19.3	15.3	26.9	18.5	19.1
Ne sait pas / Non réponse	4.0	4.7	4.6	4.7	4.1	3.9	4.6	4.6	4.6	4.0
NOMBRE DE MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA										
Un seul motif	81.3	80.0	66.4	76.3	80.4	81.4	80.1	66.5	76.3	80.5
Deux motifs ou plus	16.4	17.6	31.7	21.5	17.3	16.3	17.6	31.6	21.4	17.2
Non réponse	2.3	2.4	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3	1.9	2.2	2.3
MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA (1)										
Douleur	20.0	21.1	18.7	20.4	20.1	20.1	21.2	18.8	20.5	20.2
Saignement	0.3	0.1	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3
Insomnie ou trouble du sommeil	2.0	2.3	6.7	3.5	2.3	2.0	2.3	6.7	3.5	2.3
Symptomatologie fonctionnelle	1.6	1.6	2.0	1.7	1.6	1.6	1.7	2.0	1.8	1.6
Traumatologie	2.3	2.8	3.1	2.9	2.4	2.3	2.8	3.1	2.9	2.4
Tumeur maligne	1.6	1.8	3.7	2.3	1.7	1.5	1.7	3.6	2.3	1.7
Pathologie digestive	4.4	4.8	7.1	5.5	4.6	4.4	4.9	7.1	5.5	4.6
Affection cardio-vasculaire	22.6	20.6	23.8	21.5	22.4	22.5	20.6	23.5	21.4	22.3
Affection de l'appareil respiratoire	6.0	8.1	8.4	8.2	6.4	6.0	8.1	8.3	8.1	6.3
Surveillance de grossesse	1.1	0.3	0.1	0.2	0.9	1.1	0.3	0.1	0.2	1.0
Affection neurologique	1.7	1.2	3.2	1.8	1.7	1.7	1.2	3.3	1.8	1.7
Trouble métabolique ou nutritionnel	7.7	10.2	9.8	10.1	8.1	7.8	10.2	9.9	10.1	8.2
Affection dermatologique	2.4	2.8	2.4	2.6	2.4	2.4	2.8	2.5	2.7	2.5
ORL	17.3	15.9	8.6	13.9	16.7	17.2	15.8	8.6	13.8	16.6
Autre affection somatique	3.8	3.1	1.8	2.8	3.6	3.9	3.1	1.8	2.8	3.7
Trouble psychique	7.5	8.4	19.5	11.4	8.2	7.4	8.3	19.4	11.4	8.1
Tentative de suicide	0.0	0.1	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.1
Abus ou dépendance aux substances psycho-actives	0.7	3.2	15.4	6.6	1.8	0.7	3.2	15.4	6.6	1.8
Prévention	10.6	8.0	3.7	6.8	9.9	10.6	8.0	3.6	6.8	9.9
Raison économique ou sociale	1.1	1.4	4.3	2.2	1.3	1.1	1.4	4.4	2.2	1.3
Nombre de patients	4 201 900	678 300	254 900	933 200	5 135 100	4 289 800	691 300	261 500	952 800	5 242 600

(1) La somme des motifs est supérieure à 100 % car un même patient peut être hospitalisé pour plusieurs motifs.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-2 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le type d'acte ou le motif de recours

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
TYPE D'ACTE										
Consultation	81.8	13.8	4.4	18.2	3 927 300	81.8	13.7	4.4	18.2	4 027 300
Visite	82.5	10.5	7.0	17.5	997 800	82.4	10.5	7.0	17.6	1 003 100
Ne sait pas / Non réponse	79.3	15.1	5.6	20.7	210 000	79.3	15.1	5.6	20.7	212 200
NOMBRE DE MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA										
Un seul motif	82.8	13.1	4.1	17.2	4 128 000	82.8	13.1	4.1	17.2	4 217 900
Deux motifs ou plus	77.4	13.5	9.1	22.6	887 400	77.4	13.5	9.1	22.6	904 000
Non réponse	82.5	13.4	4.1	17.5	119 700	82.4	13.4	4.2	17.6	120 700
MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA (1)										
Douleur	81.5	13.8	4.6	18.5	1 032 700	81.5	13.8	4.7	18.5	1 057 800
Saignement	90.4	2.5	7.1	9.6	16 200	90.1	3.0	6.9	9.9	16 900
Insomnie ou trouble du sommeil	72.2	13.4	14.4	27.8	118 500	72.1	13.5	14.5	27.9	120 300
Symptomatologie fonctionnelle	80.3	13.5	6.2	19.7	82 500	80.4	13.5	6.2	19.6	85 400
Traumatologie	78.4	15.2	6.4	21.6	125 000	78.4	15.1	6.4	21.6	127 100
Tumeur maligne	75.4	13.9	10.8	24.6	86 500	75.3	13.8	10.8	24.7	87 100
Pathologie digestive	78.6	13.8	7.6	21.4	237 800	78.4	13.9	7.7	21.6	242 600
Affection cardio-vasculaire	82.6	12.2	5.3	17.4	1 149 700	82.6	12.2	5.3	17.4	1 169 300
Affection de l'appareil respiratoire	76.7	16.8	6.5	23.3	327 700	76.7	16.8	6.5	23.3	332 900
Surveillance de grossesse	96.1	3.5	0.3	3.9	48 300	96.0	3.6	0.3	4.0	51 200
Affection neurologique	81.3	9.5	9.2	18.7	87 900	80.9	9.6	9.5	19.1	90 000
Trouble métabolique ou nutritionnel	77.4	16.6	6.0	22.6	417 300	77.5	16.5	6.0	22.5	429 400
Affection dermatologique	80.1	15.0	4.9	19.9	124 300	80.0	15.1	5.0	20.0	130 000
ORL	84.9	12.6	2.6	15.1	857 200	84.9	12.5	2.6	15.1	870 600
Autre affection somatique	86.2	11.3	2.5	13.8	186 300	86.2	11.3	2.5	13.8	192 100
Trouble psychique	74.7	13.5	11.8	25.3	421 300	74.7	13.4	11.9	25.3	427 000
Tentative de suicide	21.5	17.6	60.9	78.5	3 000	21.5	17.6	61.0	78.5	3 000
Abus ou dépendance aux substances psycho-actives	33.5	23.9	42.6	66.5	92 300	33.3	23.7	43.0	66.7	93 700
Prévention	87.5	10.7	1.8	12.5	509 700	87.6	10.6	1.8	12.4	519 700
Raison économique ou sociale	68.6	14.5	16.9	31.4	65 400	68.6	14.4	17.0	31.4	67 200
Ensemble des patients	81.8	13.2	5.0	18.2	5 135 100	81.8	13.2	5.0	18.2	5 242 600

(1) La somme des motifs est supérieure au nombre total de patients car un même patient peut être hospitalisé pour plusieurs motifs.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-3 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le type d'acte ou le motif de recours

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
TYPE D'ACTE						
Consultation	43.6	49.2	3 927 300	43.4	49.2	4 027 300
Visite	34.4	29.2	997 800	34.4	29.2	1 003 100
Ne sait pas / Non réponse	43.8	49.5	210 000	43.7	49.5	212 200
NOMBRE DE MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA						
Un seul motif	41.6	45.8	4 128 000	41.4	45.9	4 217 900
Deux motifs ou plus	42.6	42.3	887 400	42.5	42.5	904 000
Non réponse	43.6	48.4	119 700	43.7	48.3	120 700
MALADIES POUR LESQUELLES LE PATIENT EST HOSPITALISE CE JOUR LA						
Douleur	41.4	51.4	1 032 700	41.3	51.5	1 057 800
Saignement	27.5	48.1	16 200	26.7	48.2	16 900
Insomnie ou trouble du sommeil	35.4	57.4	118 500	35.5	57.4	120 300
Symptomatologie fonctionnelle	31.3	49.6	82 500	31.2	49.4	85 400
Traumatologie	58.5	48.5	125 000	58.3	48.5	127 100
Tumeur maligne	49.7	36.1	86 500	49.6	36.1	87 100
Pathologie digestive	43.5	46.9	237 800	43.6	46.9	242 600
Affection cardio-vasculaire	45.9	34.8	1 149 700	45.6	35.1	1 169 300
Affection de l'appareil respiratoire	48.8	41.8	327 700	48.6	41.8	332 900
Surveillance de grossesse	///	17.4	48 300	///	17.2	51 200
Affection neurologique	44.5	40.0	87 900	44.6	40.3	90 000
Trouble métabolique ou nutritionnel	45.5	50.1	417 300	45.0	50.5	429 400
Affection dermatologique	43.5	48.5	124 300	43.2	48.1	130 000
ORL	40.6	46.9	857 200	40.5	46.8	870 600
Autre affection somatique	33.9	45.5	186 300	33.6	45.5	192 100
Trouble psychique	29.5	58.5	421 300	29.6	58.4	427 000
Tentative de suicide	37.5	65.2	3 000	37.6	65.1	3 000
Abus ou dépendance aux substances psycho-actives	62.7	59.8	92 300	62.8	59.8	93 700
Prévention	37.6	33.4	509 700	37.4	33.5	519 700
Raison économique ou sociale	39.0	60.7	65 400	38.9	60.7	67 200
Ensemble des patients	41.8	45.3	5 135 100	41.7	45.4	5 242 600

(1) La somme des motifs est supérieure au nombre total de patients car un même patient peut être hospitalisé pour plusieurs motifs.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-4 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les caractéristiques socio-démographiques

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
SEXE										
Homme	34.7	72.7	72.3	72.6	41.6	34.5	72.8	72.4	72.7	41.4
Femme	64.7	27.0	27.1	27.1	57.9	64.9	27.0	27.1	27.0	58.1
Ne sait pas / Non réponse	0.6	0.2	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.6	0.3	0.5
AGE										
16 à 24 ans	8.4	7.1	1.8	5.6	7.9	8.5	7.1	1.8	5.7	8.0
25 à 34 ans	14.1	14.3	6.9	12.3	13.8	14.2	14.4	7.1	12.4	13.9
35 à 44 ans	14.4	17.2	19.3	17.8	15.0	14.5	17.3	19.5	17.9	15.1
45 à 54 ans	14.7	21.3	26.6	22.8	16.1	14.7	21.3	26.5	22.7	16.1
55 à 64 ans	13.0	16.2	21.5	17.7	13.9	13.0	16.1	21.4	17.6	13.8
65 à 74 ans	17.5	15.1	16.7	15.6	17.1	17.3	15.1	16.6	15.5	17.0
75 à 84 ans	12.6	6.8	5.8	6.5	11.5	12.5	6.7	5.8	6.5	11.4
85 ans ou plus	4.8	1.4	0.8	1.3	4.1	4.7	1.4	0.7	1.2	4.1
Ne sait pas / Non réponse	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI										
Emploi stable	36.1	44.1	28.2	39.8	36.8	36.0	43.9	28.0	39.5	36.6
Emploi précaire	4.2	6.5	8.5	7.0	4.7	4.2	6.6	8.5	7.1	4.7
Chômeur	2.4	4.7	11.3	6.5	3.2	2.6	4.9	11.5	6.7	3.4
Retraité	38.0	31.3	34.2	32.1	37.0	37.7	31.1	33.8	31.9	36.6
Au foyer	9.8	3.7	5.7	4.2	8.8	10.0	3.7	5.8	4.3	8.9
Autre	7.6	7.4	10.5	8.2	7.7	7.7	7.5	10.5	8.3	7.8
Ne sait pas / Non réponse	1.9	2.3	1.6	2.1	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	2.0
PROFESSION										
Agriculteur exploitant	5.5	4.8	4.3	4.7	5.4	5.5	4.9	4.4	4.8	5.3
Artisan, commerçant ou chef d'entreprise	6.4	9.0	8.4	8.9	6.9	6.4	8.9	8.3	8.8	6.8
Profession libérale	1.5	2.5	0.8	2.1	1.6	1.5	2.6	0.9	2.1	1.6
Cadre ou profession intellectuelle supérieure	10.5	12.4	7.9	11.2	10.6	10.4	12.3	7.8	11.1	10.5
Profession intermédiaire	12.2	12.8	7.5	11.3	12.0	12.1	12.7	7.4	11.2	11.9
Employé	29.3	25.2	23.2	24.6	28.5	29.3	25.3	23.2	24.7	28.5
Ouvrier	13.1	22.2	33.5	25.3	15.3	13.0	22.1	33.1	25.1	15.2
Sans profession	14.6	6.9	9.6	7.6	13.3	14.8	7.0	9.9	7.8	13.6
Ne sait pas / Non réponse	6.9	4.1	4.7	4.3	6.4	7.0	4.2	4.8	4.4	6.5
DOMICILE										
Domicile stable	98.3	97.4	93.1	96.3	98.0	98.3	97.4	93.0	96.2	97.9
Domicile précaire	0.8	1.7	5.7	2.8	1.1	0.8	1.7	5.8	2.9	1.2
Sans abri	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0
Ne sait pas / Non réponse	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9

... / ...

Tableau II-4 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les caractéristiques socio-démographiques (*suite et fin*)

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
SITUATION FAMILIALE										
Seul sans enfants	22.1	20.1	27.7	22.1	22.1	22.0	20.1	27.8	22.2	22.0
Seul avec enfants	3.2	3.0	3.4	3.1	3.2	3.4	3.1	3.4	3.2	3.3
En couple sans enfants	39.5	41.9	41.9	41.9	39.9	39.1	41.5	41.4	41.5	39.5
En couple avec enfants	24.0	26.2	18.8	24.2	24.0	24.2	26.3	19.2	24.3	24.2
Avec d'autres membres de sa famille sans enfants	8.2	6.2	5.9	6.1	7.8	8.3	6.3	6.0	6.2	7.9
Avec d'autres membres de sa famille avec enfants	1.6	1.5	0.8	1.3	1.6	1.7	1.5	0.8	1.3	1.6
En collectivité sans enfants	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0
En collectivité avec enfants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ne sait pas / Non réponse	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)										
Oui	2.3	4.8	13.3	7.1	3.2	2.5	5.0	13.7	7.4	3.4
Non	88.1	86.3	77.3	83.8	87.3	87.6	85.8	76.5	83.2	86.8
Ne sait pas / Non réponse	9.7	8.9	9.5	9.1	9.6	9.9	9.2	9.7	9.4	9.8
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
Oui	4.7	7.6	16.9	10.1	5.7	5.3	8.2	17.7	10.8	6.3
Non	86.0	83.6	73.8	81.0	85.1	85.3	83.0	72.9	80.2	84.4
Ne sait pas / Non réponse	9.3	8.7	9.3	8.9	9.2	9.3	8.8	9.3	9.0	9.3
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
RMI avec ou sans CMU	2.3	4.8	13.3	7.1	3.2	2.5	5.0	13.7	7.4	3.4
CMU sans RMI	3.0	4.0	7.1	4.8	3.3	3.4	4.4	7.5	5.2	3.8
Ni RMI ni CMU	85.6	83.0	71.7	79.9	84.6	84.9	82.3	70.8	79.1	83.8
Ne sait pas / Non réponse	9.1	8.3	8.0	8.2	8.9	9.1	8.4	8.0	8.3	9.0
Nombre de patients	4 201 900	678 300	254 900	933 200	5 135 100	4 289 800	691 300	261 500	952 800	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-5 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les caractéristiques socio-démographiques

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
SEXE										
Homme	68.3	23.1	8.6	31.7	2 135 600	68.1	23.2	8.7	31.9	2 172 700
Femme	91.5	6.2	2.3	8.5	2 973 300	91.5	6.1	2.3	8.5	3 043 600
Ne sait pas / Non réponse	88.8	5.4	5.8	11.2	26 200	88.8	5.4	5.8	11.2	26 300
AGE										
16 à 24 ans	87.1	11.8	1.2	12.9	405 800	87.2	11.7	1.1	12.8	420 000
25 à 34 ans	83.8	13.7	2.5	16.2	707 000	83.8	13.6	2.5	16.2	728 900
35 à 44 ans	78.5	15.1	6.4	21.5	771 900	78.5	15.1	6.4	21.5	793 100
45 à 54 ans	74.4	17.4	8.2	25.6	829 300	74.5	17.4	8.2	25.5	846 700
55 à 64 ans	76.8	15.5	7.7	23.2	711 500	76.9	15.4	7.7	23.1	724 500
65 à 74 ans	83.5	11.7	4.8	16.5	878 500	83.4	11.7	4.9	16.6	889 600
75 à 84 ans	89.7	7.8	2.5	10.3	590 800	89.7	7.8	2.5	10.3	597 200
85 ans ou plus	94.5	4.6	0.9	5.5	211 300	94.4	4.7	0.9	5.6	213 200
Ne sait pas / Non réponse	80.7	14.1	5.2	19.3	29 000	81.0	13.9	5.1	19.0	29 400
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI										
Emploi stable	80.3	15.9	3.8	19.7	1 887 200	80.4	15.8	3.8	19.6	1 918 900
Emploi précaire	72.6	18.3	9.1	27.4	240 200	72.5	18.4	9.0	27.5	247 300
Chômeur	62.8	19.6	17.6	37.2	163 500	63.8	19.1	17.1	36.2	176 800
Retraité	84.2	11.2	4.6	15.8	1 898 100	84.2	11.2	4.6	15.8	1 919 100
Au foyer	91.2	5.5	3.2	8.8	451 000	91.3	5.5	3.2	8.7	468 100
Autre	80.5	12.7	6.8	19.5	395 200	80.6	12.6	6.7	19.4	407 700
Ne sait pas / Non réponse	80.5	15.3	4.2	19.5	99 900	80.3	15.1	4.6	19.7	104 700
PROFESSION										
Agriculteur exploitant	84.1	11.9	4.0	15.9	274 900	83.8	12.0	4.1	16.2	279 900
Artisan, commerçant ou chef d'entreprise	76.5	17.4	6.1	23.5	352 200	76.6	17.3	6.1	23.4	356 900
Profession libérale	77.0	20.4	2.5	23.0	84 300	76.8	20.5	2.8	23.2	86 200
Cadre ou profession intellectuelle supérieure	80.8	15.5	3.7	19.2	545 800	80.9	15.4	3.7	19.1	552 900
Profession intermédiaire	82.9	14.1	3.1	17.1	617 400	82.9	14.0	3.1	17.1	625 200
Employé	84.3	11.7	4.0	15.7	1 462 200	84.2	11.7	4.1	15.8	1 492 700
Ouvrier	70.0	19.2	10.9	30.0	786 300	69.9	19.2	10.9	30.1	795 400
Sans profession	89.6	6.8	3.6	10.4	683 700	89.5	6.8	3.6	10.5	711 400
Ne sait pas / Non réponse	87.8	8.5	3.7	12.2	328 300	87.8	8.5	3.7	12.2	342 000
DOMICILE										
Domicile stable	82.1	13.1	4.7	17.9	5 030 400	82.1	13.1	4.7	17.9	5 133 400
Domicile précaire	54.9	20.0	25.1	45.1	57 800	55.0	19.8	25.2	45.0	60 400
Sans abri	42.2	9.4	48.4	57.8	2 200	41.2	9.1	49.7	58.8	2 300
Ne sait pas / Non réponse	83.2	12.5	4.3	16.8	44 700	83.3	12.5	4.3	16.7	46 500

... / ...

Tableau II-5 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les caractéristiques socio-démographiques (*suite et fin*)

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
SITUATION FAMILIALE										
Seul sans enfants	81.8	12.0	6.2	18.2	1 136 000	81.7	12.0	6.3	18.3	1 153 400
Seul avec enfants	82.3	12.4	5.3	17.7	164 400	82.7	12.2	5.1	17.3	175 100
En couple sans enfants	80.9	13.9	5.2	19.1	2 050 600	80.9	13.9	5.2	19.1	2 070 600
En couple avec enfants	81.7	14.4	3.9	18.3	1 232 000	81.7	14.3	3.9	18.3	1 270 200
Avec d'autres membres de sa famille sans enfants	85.8	10.4	3.7	14.2	401 600	85.8	10.5	3.7	14.2	416 700
Avec d'autres membres de sa famille avec enfants	85.1	12.4	2.6	14.9	79 800	85.1	12.3	2.6	14.9	84 900
En collectivité sans enfants	85.3	10.3	4.4	14.7	50 400	85.0	10.6	4.4	15.0	50 800
En collectivité avec enfants	93.4	6.6	0.0	6.6	500	93.5	6.5	0.0	6.5	500
Ne sait pas / Non réponse	75.8	16.1	8.1	24.2	19 800	76.1	15.9	8.1	23.9	20 400
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)										
Oui	59.1	20.0	20.9	40.9	162 200	60.7	19.3	20.0	39.3	179 500
Non	82.5	13.1	4.4	17.5	4 482 000	82.6	13.0	4.4	17.4	4 551 200
Ne sait pas / Non réponse	82.7	12.4	4.9	17.3	490 900	82.6	12.5	5.0	17.4	511 900
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
Oui	67.4	17.8	14.8	32.6	290 700	68.9	17.1	14.0	31.1	331 700
Non	82.7	13.0	4.3	17.3	4 370 200	82.7	13.0	4.3	17.3	4 424 300
Ne sait pas / Non réponse	82.5	12.5	5.0	17.5	474 200	82.4	12.6	5.0	17.6	486 600
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)										
RMI avec ou sans CMU	59.1	20.0	20.9	40.9	162 200	60.7	19.3	20.0	39.3	179 400
CMU sans RMI	73.8	15.7	10.5	26.2	171 400	74.8	15.2	10.0	25.2	197 700
Ni RMI ni CMU	82.8	13.0	4.2	17.2	4 343 400	82.9	12.9	4.2	17.1	4 395 600
Ne sait pas / Non réponse	83.3	12.2	4.5	16.7	458 100	83.2	12.3	4.4	16.8	469 900
Ensemble des patients	81.8	13.2	5.0	18.2	5 135 100	81.8	13.2	5.0	18.2	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau II-6 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus
vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite
une semaine donnée en 2000 selon les caractéristiques sociales**

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
SEXE						
Homme	///	47.6	2 135 600	///	47.7	2 172 700
Femme	///	43.6	2 973 300	///	43.6	3 043 600
Ne sait pas / Non réponse	///	51.2	26 200	///	51.1	26 300
AGE						
16 à 24 ans	39.8	///	405 800	39.7	///	420 000
25 à 34 ans	38.8	///	707 000	38.5	///	728 900
35 à 44 ans	41.6	///	771 900	41.4	///	793 100
45 à 54 ans	44.5	///	829 300	44.3	///	846 700
55 à 64 ans	46.0	///	711 500	45.9	///	724 500
65 à 74 ans	44.3	///	878 500	44.3	///	889 600
75 à 84 ans	38.7	///	590 800	38.6	///	597 200
85 ans ou plus	29.7	///	211 300	29.7	///	213 200
Ne sait pas / Non réponse	45.7	///	29 000	45.1	///	29 400
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI						
Emploi stable	47.5	68.3	1 887 200	47.4	68.3	1 918 900
Emploi précaire	41.9	41.9	240 200	41.8	42.0	247 300
Chômeur	47.3	64.8	163 500	46.5	64.2	176 800
Retraité	45.5	20.4	1 898 100	45.5	20.4	1 919 100
Au foyer	1.8	56.8	451 000	1.9	56.7	468 100
Autre	41.3	34.4	395 200	41.2	34.4	407 700
Ne sait pas / Non réponse	37.8	50.0	99 900	37.9	49.9	104 700
PROFESSION						
Agriculteur exploitant	49.6	27.7	274 900	49.8	27.8	279 900
Artisan, commerçant ou chef d'entreprise	59.4	44.6	352 200	59.4	44.7	356 900
Profession libérale	55.8	58.2	84 300	55.7	58.3	86 200
Cadre ou profession intellectuelle supérieure	58.2	54.0	545 800	58.1	54.2	552 900
Profession intermédiaire	44.5	51.0	617 400	44.4	51.0	625 200
Employé	31.2	49.8	1 462 200	31.2	49.8	1 492 700
Ouvrier	66.8	47.1	786 300	67.0	47.1	795 400
Sans profession	14.1	32.0	683 700	14.3	32.4	711 400
Ne sait pas / Non réponse	25.4	35.6	328 300	25.3	35.7	342 000
DOMICILE						
Domicile stable	41.6	45.3	5 030 400	41.5	45.4	5 133 400
Domicile précaire	57.4	45.3	57 800	57.2	45.3	60 400
Sans abri	80.3	64.2	2 200	80.5	62.9	2 300
Ne sait pas / Non réponse	40.2	40.5	44 700	39.9	40.7	46 500

... / ...

Tableau II-6 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon les caractéristiques sociales (suite et fin)


	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
SITUATION FAMILIALE						
Seul sans enfants	33.2	29.6	1 136 000	33.3	29.8	1 153 400
Seul avec enfants	11.7	62.5	164 400	11.5	62.3	175 100
En couple sans enfants	48.6	44.3	2 050 600	48.6	44.3	2 070 600
En couple avec enfants	43.2	69.1	1 232 000	43.0	68.9	1 270 200
Avec d'autres membres de sa famille sans enfants	43.1	21.8	401 600	42.9	21.8	416 700
Avec d'autres membres de sa famille avec enfants	29.9	33.4	79 800	29.5	33.4	84 900
En collectivité sans enfants	28.6	9.5	50 400	28.8	9.6	50 800
En collectivité avec enfants	24.2	0.0	500	23.6	0.0	500
Ne sait pas / Non réponse	47.2	46.8	19 800	46.5	46.6	20 400
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)						
Oui	43.2	62.8	162 200	42.0	62.3	179 500
Non	41.8	45.0	4 482 000	41.7	45.0	4 551 200
Ne sait pas / Non réponse	41.4	42.2	490 900	41.0	42.3	511 900
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)						
Oui	41.4	55.0	290 700	39.8	53.9	331 700
Non	41.8	45.0	4 370 200	41.7	45.1	4 424 300
Ne sait pas / Non réponse	42.3	41.9	474 200	42.1	42.2	486 600
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)						
RMI avec ou sans CMU	43.2	62.8	162 200	42.0	62.3	179 400
CMU sans RMI	41.5	50.1	171 400	39.6	48.7	197 700
Ni RMI ni CMU	41.8	44.9	4 343 400	41.7	45.0	4 395 600
Ne sait pas / Non réponse	41.7	41.0	458 100	41.6	41.1	469 900
Ensemble des patients	41.8	45.3	5 135 100	41.7	45.4	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,


enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Graphique II-1 : Répartition par sexe et âge des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000

Ensemble des patients




Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive




... / ...

Graphique II-1 : Répartition par sexe et âge des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 (suite et fin)

Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants



Patients dépendants à l'alcool





Champ : France métropolitaine.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Graphique II-2 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 présentant un risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et l'âge



□ Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants □ Patients dépendants à l'alcool

Champ : France métropolitaine.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-7 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les antécédents médicaux

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)										
Oui	1.7	2.5	6.8	3.7	2.1	1.7	2.5	6.8	3.7	2.1
Non	88.4	88.0	82.0	86.4	88.0	88.1	87.6	81.5	86.0	87.7
Ne sait pas / Non réponse	9.9	9.5	11.1	9.9	9.9	10.2	9.8	11.7	10.3	10.2
PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE										
Oui	9.6	12.6	21.8	15.1	10.6	9.5	12.5	21.6	15.0	10.5
Non	89.5	86.5	76.4	83.8	88.4	89.5	86.5	76.6	83.8	88.5
Ne sait pas / Non réponse	0.9	0.9	1.8	1.1	1.0	1.0	0.9	1.8	1.2	1.0
EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)										
Oui	20.7	22.0	34.1	25.3	21.6	20.8	22.1	34.2	25.4	21.6
Non	78.0	77.0	64.0	73.4	77.1	77.9	76.8	63.9	73.3	77.1
Ne sait pas / Non réponse	1.3	1.0	1.9	1.3	1.3	1.3	1.0	1.9	1.3	1.3
HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT										
Oui	3.4	5.9	14.9	8.3	4.3	3.4	5.8	14.9	8.3	4.3
Non	95.7	93.3	84.0	90.7	94.8	95.7	93.3	84.0	90.7	94.8
Ne sait pas / Non réponse	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9
AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS										
Oui	9.3	15.9	19.3	16.8	10.6	9.2	15.8	19.2	16.7	10.6
Non	88.7	81.7	77.9	80.7	87.2	88.7	81.9	78.0	80.8	87.3
Ne sait pas / Non réponse	2.1	2.4	2.8	2.5	2.1	2.1	2.3	2.8	2.5	2.1
Nombre de patients	4 201 900	678 300	254 900	933 200	5 135 100	4 289 800	691 300	261 500	952 800	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-8: Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les antécédents médicaux

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)										
Oui	67.5	16.0	16.5	32.5	106 000	67.6	16.1	16.3	32.4	109 200
Non	82.2	13.2	4.6	17.8	4 520 300	82.2	13.2	4.6	17.8	4 596 800
Ne sait pas / Non réponse	81.8	12.6	5.6	18.2	508 800	81.6	12.7	5.7	18.4	536 600
PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE										
Oui	74.0	15.7	10.2	26.0	543 100	74.1	15.7	10.2	25.9	551 900
Non	82.8	12.9	4.3	17.2	4 541 900	82.8	12.9	4.3	17.2	4 638 200
Ne sait pas / Non réponse	78.9	11.9	9.2	21.1	50 100	79.0	12.1	8.9	21.0	52 500
EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)										
Oui	78.7	13.5	7.8	21.3	1 107 400	78.6	13.5	7.9	21.4	1 132 900
Non	82.7	13.2	4.1	17.3	3 961 400	82.7	13.1	4.1	17.3	4 041 000
Ne sait pas / Non réponse	82.3	10.3	7.4	17.7	66 300	82.4	10.3	7.4	17.6	68 700
HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT										
Oui	65.0	17.9	17.1	35.0	222 100	65.0	17.8	17.1	35.0	226 500
Non	82.6	13.0	4.4	17.4	4 867 500	82.6	13.0	4.4	17.4	4 968 600
Ne sait pas / Non réponse	80.8	13.3	5.9	19.2	45 500	80.9	13.1	6.1	19.1	47 500
AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS										
Oui	71.2	19.8	9.0	28.8	545 900	71.3	19.6	9.0	28.7	555 600
Non	83.2	12.4	4.4	16.8	4 480 000	83.2	12.4	4.5	16.8	4 575 100
Ne sait pas / Non réponse	78.9	14.6	6.5	21.1	109 200	78.9	14.5	6.6	21.1	111 900
Ensemble des patients	81.8	13.2	5.0	18.2	5 135 100	81.8	13.2	5.0	18.2	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

**Tableau II-9: Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus
vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite
une semaine donnée en 2000 selon les antécédents médicaux**

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)						
Oui	50.3	68.6	106 000	50.2	68.4	109 200
Non	41.7	45.0	4 520 300	41.6	45.0	4 596 800
Ne sait pas / Non réponse	41.3	42.9	508 800	40.8	43.3	536 600
PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE						
Oui	49.6	45.9	543 100	49.5	46.1	551 900
Non	40.8	45.3	4 541 900	40.7	45.3	4 638 200
Ne sait pas / Non réponse	44.1	37.6	50 100	44.0	37.9	52 500
EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)						
Oui	47.3	35.3	1 107 400	47.1	35.6	1 132 900
Non	40.2	48.0	3 961 400	40.1	48.0	4 041 000
Ne sait pas / Non réponse	44.6	49.3	66 300	44.6	49.2	68 700
HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT						
Oui	52.8	47.4	222 100	52.8	47.5	226 500
Non	41.3	45.2	4 867 500	41.1	45.2	4 968 600
Ne sait pas / Non réponse	44.8	46.3	45 500	44.8	46.1	47 500
AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES 12 DERNIERS MOIS						
Oui	47.6	66.7	545 900	47.5	66.6	555 600
Non	41.0	43.0	4 480 000	40.9	43.1	4 575 100
Ne sait pas / Non réponse	43.9	33.6	109 200	43.8	33.7	111 900
Ensemble des patients	41.8	45.3	5 135 100	41.7	45.4	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,
enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-10 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS										
Fréquence de la consommation d'alcool										
Jamais	24.9	7.1	4.3	6.4	21.5	25.3	7.4	4.4	6.5	21.9
1 fois par mois ou moins	25.0	6.5	1.6	5.2	21.4	25.1	6.6	1.7	5.3	21.5
2 à 4 fois par mois	21.7	15.6	3.9	12.4	20.0	21.5	15.8	3.9	12.5	19.9
2 à 3 fois par semaine	9.5	17.4	8.3	14.9	10.5	9.4	17.4	8.4	14.9	10.4
4 à 6 fois par semaine	2.0	7.4	5.6	6.9	2.9	2.0	7.4	5.7	6.9	2.9
Tous les jours	15.9	45.4	74.4	53.3	22.7	15.7	44.9	74.0	52.9	22.4
Ne sait pas / Non réponse	1.0	0.6	1.9	1.0	1.0	1.0	0.6	2.0	1.0	1.0
En cas de consommation d'alcool, nombre de verres consommés quotidiennement										
1 ou 2 verres	59.3	29.6	8.3	23.8	52.8	59.0	29.7	8.4	23.8	52.6
3 ou 4 verres	13.2	39.9	25.5	36.0	17.4	13.1	39.7	25.4	35.8	17.2
5 ou 6 verres	0.9	17.9	28.4	20.8	4.5	0.9	17.8	28.4	20.7	4.5
7 à 9 verres	0.1	2.3	16.5	6.2	1.2	0.1	2.3	16.5	6.2	1.2
10 verres ou plus	0.1	1.6	13.5	4.9	0.9	0.1	1.7	13.4	4.9	0.9
Non réponse	0.6	0.8	1.6	1.0	0.6	0.6	0.8	1.6	1.0	0.7
Sans objet	24.9	7.1	4.3	6.4	21.5	25.3	7.4	4.4	6.5	21.9
Ne sait pas / Non réponse	1.0	0.6	1.9	1.0	1.0	1.0	0.6	2.0	1.0	1.0
Fréquence de consommation de 6 verres ou davantage au cours de la même occasion										
Jamais	83.7	30.3	17.1	26.7	73.3	83.8	30.6	17.1	26.9	73.5
Moins d'1 fois par mois	13.9	22.9	16.0	21.0	15.2	13.7	22.8	15.9	20.9	15.0
1 fois par mois	0.0	33.7	17.2	29.2	5.3	0.0	33.6	17.2	29.1	5.3
1 fois par semaine	0.0	10.4	23.8	14.1	2.6	0.0	10.4	23.9	14.1	2.6
Tous les jours ou presque	0.0	1.0	21.1	6.5	1.2	0.0	1.0	21.2	6.5	1.2
Ne sait pas / Non réponse	2.5	1.6	4.8	2.5	2.5	2.5	1.6	4.8	2.5	2.5
USAGE DECLARE D'ALCOOL										
Non-usage	24.9	7.1	4.3	6.4	21.5	25.3	7.4	4.4	6.5	21.9
Usage sans risque	72.4	36.9	18.1	31.8	65.1	72.0	37.0	18.0	31.8	64.7
Usage ponctuel à risque	0.0	38.1	17.9	32.6	5.9	0.0	38.1	18.3	32.6	5.9
Usage régulier à risque	0.0	16.2	55.1	26.8	4.9	0.0	16.0	54.7	26.6	4.8
Patient inclassable	2.7	1.6	4.6	2.4	2.6	2.7	1.6	4.7	2.4	2.6

... / ...

Tableau II-10 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool (suite et fin)

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
TEST DETA										
Au cours de votre vie :										
Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	1.7	55.0	70.6	59.3	12.2	1.7	55.4	70.7	59.6	12.2
Non	96.6	44.0	27.3	39.4	86.2	96.5	43.6	27.1	39.1	86.1
Ne sait pas / Non réponse	1.7	1.0	2.1	1.3	1.7	1.8	1.0	2.2	1.3	1.7
Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	1.2	43.8	78.3	53.2	10.6	1.2	44.1	78.6	53.6	10.7
Non	97.1	55.1	19.5	45.4	87.7	97.1	54.9	19.2	45.1	87.7
Ne sait pas / Non réponse	1.7	1.1	2.2	1.4	1.6	1.7	1.1	2.2	1.4	1.6
Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez Trop ?										
Oui	2.6	59.4	73.5	63.2	13.6	2.6	59.5	73.6	63.4	13.6
Non	95.5	39.2	23.7	35.0	84.5	95.5	39.1	23.5	34.8	84.5
Ne sait pas / Non réponse	1.9	1.4	2.8	1.8	1.9	1.9	1.4	2.9	1.8	1.9
Avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le matin pour vous sentir en forme ?										
Oui	0.2	4.5	55.4	18.4	3.5	0.2	4.6	55.6	18.6	3.5
Non	97.9	94.2	41.8	79.9	94.6	97.9	94.1	41.5	79.6	94.5
Ne sait pas / Non réponse	1.9	1.3	2.8	1.7	1.9	2.0	1.3	2.9	1.7	1.9
RESULTAT DU TEST DETA										
Problème avec l'alcool passé ou présent										
Patient réputé indemne	0.0	58.8	81.4	65.0	11.8	0.0	59.2	81.6	65.3	11.9
Patient inclassable	98.3	39.9	16.4	33.4	86.5	98.2	39.5	16.1	33.1	86.4
	1.7	1.3	2.2	1.6	1.7	1.8	1.3	2.3	1.6	1.7
PROBLEME AVEC L'ALCOOL SELON LE MEDECIN										
Oui	0.0	32.2	95.2	49.4	9.0	0.0	32.1	95.1	49.4	9.0
Non	97.3	63.0	4.1	46.9	88.2	97.4	63.1	4.1	46.9	88.2
Ne sait pas / Non réponse	2.7	4.9	0.7	3.7	2.8	2.6	4.8	0.7	3.7	2.8
SIGNES DE DEPENDANCE PHYSIQUE SELON LE MEDECIN										
Sans objet	97.3	63.0	4.1	46.9	88.2	97.4	63.1	4.1	46.9	88.2
Oui	0.0	0.0	75.0	20.5	3.7	0.0	0.0	74.9	20.6	3.7
Non	0.4	33.5	19.5	29.6	5.7	0.3	33.4	19.5	29.6	5.7
Ne sait pas / Non réponse	2.3	3.6	1.5	3.0	2.4	2.3	3.5	1.5	3.0	2.4
Nombre de patients	4 201 900	678 300	254 900	933 200	5 135 100	4 289 800	691 300	261 500	952 800	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-11 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS										
Fréquence de la consommation d'alcool										
Jamais	94.6	4.4	1.0	5.4	1 104 500	94.6	4.4	1.0	5.4	1 149 000
1 fois par mois ou moins	95.6	4.0	0.4	4.4	1 099 000	95.5	4.1	0.4	4.5	1 129 100
2 à 4 fois par mois	88.7	10.3	1.0	11.3	1 027 700	88.6	10.5	1.0	11.4	1 041 900
2 à 3 fois par semaine	74.2	21.9	3.9	25.8	538 300	74.0	22.0	4.0	26.0	545 100
4 à 6 fois par semaine	56.7	33.7	9.6	43.3	148 600	56.4	33.8	9.8	43.6	151 000
Tous les jours	57.4	26.4	16.2	42.6	1 167 600	57.2	26.4	16.5	42.8	1 176 000
Ne sait pas / Non réponse	81.3	8.8	9.9	18.7	49 400	81.1	8.8	10.1	18.9	50 500
En cas de consommation d'alcool, nombre de verres consommés quotidiennement										
1 ou 2 verres	91.8	7.4	0.8	8.2	2 713 000	91.8	7.4	0.8	8.2	2 756 500
3 ou 4 verres	62.4	30.3	7.3	37.6	892 200	62.2	30.4	7.4	37.8	902 800
5 ou 6 verres	16.1	52.6	31.3	83.9	231 400	16.2	52.3	31.5	83.8	235 400
7 à 9 verres	8.8	25.1	66.1	91.2	63 600	8.7	25.0	66.3	91.3	64 900
10 verres ou plus	5.5	23.1	71.4	94.5	48 300	5.4	23.2	71.4	94.6	49 200
Non réponse	70.7	16.8	12.6	29.3	32 700	70.9	16.6	12.5	29.1	34 300
Sans objet	94.6	4.4	1.0	5.4	1 104 500	94.6	4.4	1.0	5.4	1 149 000
Ne sait pas / Non réponse	81.3	8.8	9.9	18.7	49 400	81.1	8.8	10.1	18.9	50 500
Fréquence de consommation de 6 verres ou davantage au cours de la même occasion										
Jamais	93.4	5.5	1.2	6.6	3 764 500	93.3	5.5	1.2	6.7	3 851 300
Moins d'1 fois par mois	74.8	20.0	5.2	25.2	779 300	74.7	20.0	5.3	25.3	788 200
1 fois par mois	0.1	83.8	16.1	99.9	272 900	0.1	83.6	16.2	99.9	277 300
1 fois par semaine	0.1	53.8	46.1	99.9	131 700	0.1	53.5	46.4	99.9	134 600
Tous les jours ou presque	0.0	10.7	89.3	100.0	60 300	0.0	10.7	89.3	100.0	62 000
Ne sait pas / Non réponse	81.5	8.8	9.7	18.5	126 400	81.5	8.7	9.8	18.5	129 200
USAGE DECLARE D'ALCOOL										
Non-usage	94.6	4.4	1.0	5.4	1 104 500	94.6	4.4	1.0	5.4	1 149 000
Usage sans risque	91.1	7.5	1.4	8.9	3 341 000	91.1	7.6	1.4	8.9	3 391 400
Usage ponctuel à risque	0.0	85.0	15.0	100.0	304 500	0.0	84.6	15.4	100.0	310 800
Usage régulier à risque	0.0	43.9	56.1	100.0	250 200	0.0	43.5	56.5	100.0	253 400
Patient inclassable	83.3	8.0	8.7	16.7	134 900	83.1	8.0	8.9	16.9	138 000

... / ...

Tableau II-11 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool (suite et fin)

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
TEST DETA										
Au cours de votre vie :										
Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	11.5	59.7	28.8	88.5	624 900	11.6	59.6	28.8	88.4	642 200
Non	91.7	6.7	1.6	8.3	4 425 000	91.7	6.7	1.6	8.3	4 512 200
Ne sait pas / Non réponse	85.6	8.1	6.4	14.4	85 200	85.7	7.8	6.4	14.3	88 200
Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?										
Oui	9.1	54.3	36.5	90.9	546 800	9.1	54.3	36.6	90.9	561 000
Non	90.6	8.3	1.1	9.4	4 505 500	90.7	8.3	1.1	9.3	4 595 900
Ne sait pas / Non réponse	84.6	8.7	6.7	15.4	82 800	84.8	8.5	6.8	15.2	85 700
Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez Trop ?										
Oui	15.6	57.6	26.8	84.4	699 300	15.5	57.6	26.9	84.5	714 600
Non	92.5	6.1	1.4	7.5	4 339 600	92.5	6.1	1.4	7.5	4 428 200
Ne sait pas / Non réponse	82.7	9.8	7.5	17.3	96 200	82.7	9.6	7.7	17.3	99 800
Avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le matin pour vous sentir en forme ?										
Oui	4.1	17.2	78.7	95.9	179 500	4.1	17.4	78.5	95.9	185 200
Non	84.7	13.1	2.2	15.3	4 857 800	84.7	13.1	2.2	15.3	4 956 400
Ne sait pas / Non réponse	83.7	9.0	7.3	16.3	97 800	83.7	8.9	7.4	16.3	101 000
RESULTAT DU TEST DETA										
Problème avec l'alcool passé ou présent										
Patient réputé indemne	93.0	6.1	0.9	7.0	4 441 000	93.0	6.0	0.9	7.0	4 529 400
Patient inclassable	83.2	10.2	6.5	16.8	87 600	83.4	10.0	6.6	16.6	90 800
PROBLEME AVEC L'ALCOOL SELON LE MEDECIN										
Oui	0.0	47.3	52.7	100.0	461 000	0.0	47.1	52.9	100.0	470 700
Non	90.3	9.4	0.2	9.7	4 528 000	90.3	9.4	0.2	9.7	4 624 800
Ne sait pas / Non réponse	76.2	22.5	1.2	23.8	146 100	76.2	22.6	1.3	23.8	147 100
SIGNES DE DEPENDANCE PHYSIQUE SELON LE MEDECIN										
Sans objet										
Oui	0.0	0.0	100.0	100.0	191 100	0.0	0.0	100.0	100.0	195 800
Non	5.1	77.9	17.1	94.9	291 400	5.0	77.8	17.2	95.0	296 600
Ne sait pas / Non réponse	77.6	19.4	3.0	22.4	124 600	77.5	19.4	3.1	22.5	125 400
Ensemble des patients	81.8	13.2	5.0	18.2	5 135 100	81.8	13.2	5.0	18.2	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-12 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS						
Fréquence de la consommation d'alcool						
Jamais	22.3	38.2	1 104 500	22.2	38.3	1 149 000
1 fois par mois ou moins	24.9	41.2	1 099 000	25.0	41.4	1 129 100
2 à 4 fois par mois	40.0	48.7	1 027 700	40.1	48.8	1 041 900
2 à 3 fois par semaine	55.2	54.1	538 300	55.4	54.1	545 100
4 à 6 fois par semaine	64.3	53.3	148 600	64.5	53.3	151 000
Tous les jours	68.8	48.1	1 167 600	68.8	48.2	1 176 000
Ne sait pas / Non réponse	39.0	37.0	49 400	38.9	37.2	50 500
En cas de consommation d'alcool, nombre de verres consommés quotidiennement						
1 ou 2 verres	37.1	44.4	2 713 000	37.0	44.5	2 756 500
3 ou 4 verres	66.8	52.3	892 200	66.8	52.3	902 800
5 ou 6 verres	77.2	57.3	231 400	77.2	57.4	235 400
7 à 9 verres	81.0	55.7	63 600	81.1	55.8	64 900
10 verres ou plus	79.7	62.3	48 300	80.0	62.0	49 200
Non réponse	33.1	50.2	32 700	32.8	50.9	34 300
Sans objet	22.3	38.2	1 104 500	22.2	38.3	1 149 000
Ne sait pas / Non réponse	39.0	37.0	49 400	38.9	37.2	50 500
Fréquence de consommation de 6 verres ou davantage au cours de la même occasion						
Jamais	31.9	42.0	3 764 500	31.8	42.1	3 851 300
Moins d'1 fois par mois	67.3	53.1	779 300	67.2	53.1	788 200
1 fois par mois	79.6	54.9	272 900	79.5	54.9	277 300
1 fois par semaine	79.0	63.4	131 700	79.3	63.3	134 600
Tous les jours ou presque	78.5	72.1	60 300	78.3	72.2	62 000
Ne sait pas / Non réponse	40.9	43.9	126 400	40.9	43.9	129 200
USAGE DECLARE D'ALCOOL						
Non-usage	22.3	38.2	1 104 500	22.2	38.3	1 149 000
Usage sans risque	42.8	45.4	3 341 000	42.8	45.5	3 391 400
Usage ponctuel à risque	82.5	53.0	304 500	82.4	53.1	310 800
Usage régulier à risque	64.9	65.4	250 200	64.9	65.4	253 400
Patient inclassable	40.9	45.1	134 900	40.9	45.1	138 000

... / ...

Tableau II-12 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon les différentes variables de mesure des problèmes avec l'alcool (suite et fin)

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
TEST DETA						
Au cours de votre vie :						
Avez-vous déjà ressenti le besoin de <u>D</u> iminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?						
Oui	70.0	63.7	624 900	70.0	63.6	642 200
Non	38.0	42.8	4 425 000	37.8	42.9	4 512 200
Ne sait pas / Non réponse	34.9	37.3	85 200	34.7	37.8	88 200
Votre <u>E</u> ntourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?						
Oui	76.4	60.1	546 800	76.4	60.0	561 000
Non	37.7	43.6	4 505 500	37.6	43.6	4 595 900
Ne sait pas / Non réponse	33.4	41.1	82 800	33.3	41.4	85 700
Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez <u>T</u> rop ?						
Oui	70.8	61.4	699 300	70.8	61.3	714 600
Non	37.2	42.8	4 339 600	37.0	42.9	4 428 200
Ne sait pas / Non réponse	38.6	38.9	96 200	38.3	39.2	99 800
Avez-vous déjà eu besoin d' <u>A</u> lcool le matin pour vous sentir en forme ?						
Oui	69.4	67.5	179 500	69.4	67.3	185 200
Non	40.9	44.6	4 857 800	40.7	44.6	4 956 400
Ne sait pas / Non réponse	36.0	41.2	97 800	35.9	41.3	101 000
RESULTAT DU TEST DETA						
Problème avec l'alcool passé ou						
présent	72.3	63.3	606 500	72.4	63.2	622 400
Patient réputé indemne	37.7	42.9	4 441 000	37.5	43.0	4 529 400
Patient inclassable	38.2	40.7	87 600	38.0	41.0	90 800
PROBLEME AVEC L'ALCOOL SELON LE MEDECIN						
Oui	73.5	64.4	461 000	73.5	64.4	470 700
Non	38.5	43.3	4 528 000	38.4	43.4	4 624 800
Ne sait pas / Non réponse	43.4	45.8	146 100	43.4	45.8	147 100
SIGNES DE DEPENDANCE PHYSIQUE SELON LE MEDECIN						
Sans objet	38.5	43.3	4 528 000	38.4	43.4	4 624 800
Oui	71.1	69.2	191 100	71.3	69.3	195 800
Non	74.4	60.0	291 400	74.3	60.0	296 600
Ne sait pas / Non réponse	39.4	45.5	124 600	39.4	45.5	125 400
Ensemble des patients	41.8	45.3	5 135 100	41.7	45.4	5 242 600

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-13 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
HABITUDES TABAGIQUES										
Non fumeur	49.5	18.4	12.3	16.7	43.5	49.9	18.6	12.5	17.0	43.9
Ex fumeur	17.6	27.9	17.9	25.2	19.0	17.5	27.8	17.7	25.0	18.9
Fumeur occasionnel	7.2	8.2	5.6	7.4	7.2	7.1	8.2	5.8	7.5	7.2
Fumeur régulier	18.4	42.0	60.1	46.9	23.6	18.2	41.8	59.7	46.7	23.4
Dont fumant quotidiennement										
1 à 5 cigarettes	3.1	3.9	1.9	3.4	3.2	3.2	4.0	1.9	3.4	3.2
6 à 20 cigarettes	13.1	29.2	35.6	30.9	16.3	13.0	29.0	35.4	30.8	16.2
21 à 40 cigarettes	1.8	7.6	20.0	11.0	3.4	1.7	7.6	19.8	11.0	3.4
plus de 40 cigarettes	0.1	0.5	0.8	0.6	0.2	0.1	0.5	0.8	0.6	0.2
non réponse	0.3	0.7	1.7	1.0	0.5	0.3	0.7	1.7	1.0	0.5
Patient inclassable	7.3	3.6	4.2	3.7	6.7	7.3	3.5	4.2	3.7	6.6
ABUS OU DEPENDANCE AUX PSYCHOTROPES (1)										
Oui	0.9	2.2	5.2	3.0	1.2	0.9	2.1	5.2	3.0	1.2
Non ou non réponse	99.1	97.8	94.8	97.0	98.8	99.1	97.9	94.8	97.0	98.8
ABUS OU DEPENDANCE AUX DROGUES ILLEGALES (1)										
Oui	0.4	2.0	2.6	2.2	0.7	0.4	2.0	2.6	2.2	0.7
Non ou non réponse	99.6	98.0	97.4	97.8	99.3	99.6	98.0	97.4	97.8	99.3
TABAC REGULIER OU PSYCHOTROPES OU DROGUES ILLEGALES										
Au moins un des trois (2)	19.0	42.9	61.8	48.0	24.2	18.8	42.7	61.4	47.8	24.1
Aucun des trois	73.7	53.6	34.2	48.3	69.1	73.9	53.8	34.5	48.5	69.3
Patient inclassable	7.3	3.5	4.1	3.7	6.7	7.3	3.5	4.1	3.7	6.6
Nombre de patients	4 201 900	678 300	254 900	933 200	5 135 100	4 289 800	691 300	261 500	952 800	5 242 600

(1) Mentionné par le médecin soit en motif de recours le jour de l'enquête, soit en autre problème de santé connu.

(2) Ce chiffre est inférieur à la somme des trois autres pris individuellement car un même patient peut cumuler plusieurs types de produits.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-14 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
HABITUDES TABAGIQUES										
Non fumeur	93.0	5.6	1.4	7.0	2 235 700	93.0	5.6	1.4	7.0	2 300 600
Ex fumeur	75.9	19.4	4.7	24.1	976 200	75.9	19.4	4.7	24.1	988 500
Fumeur occasionnel	81.2	14.9	3.8	18.8	370 400	81.0	15.0	4.0	19.0	377 400
Fumeur régulier	63.8	23.5	12.7	36.2	1 209 400	63.7	23.5	12.7	36.3	1 227 700
Dont fumant quotidiennement										
1 à 5 cigarettes	80.6	16.4	3.0	19.4	163 500	80.7	16.3	3.0	19.3	167 600
6 à 20 cigarettes	65.5	23.6	10.8	34.5	837 600	65.4	23.6	10.9	34.6	849 000
21 à 40 cigarettes	41.8	29.3	28.8	58.2	176 500	41.6	29.4	29.0	58.4	178 700
plus de 40 cigarettes	35.6	39.1	25.2	64.4	8 200	35.5	38.7	25.8	64.5	8 500
non réponse	60.0	21.5	18.6	40.0	23 600	59.8	21.6	18.6	40.2	23 900
Patient inclassable	89.8	7.1	3.1	10.2	343 400	89.8	7.0	3.2	10.2	348 400
ABUS OU DEPENDANCE AUX PSYCHOTROPES (1)										
Oui	56.5	22.8	20.7	43.5	64 100	56.3	22.7	21.0	43.7	65 100
Non ou non réponse	82.1	13.1	4.8	17.9	5 071 000	82.1	13.1	4.8	17.9	5 177 500
ABUS OU DEPENDANCE AUX DROGUES ILLEGALES (1)										
Oui	42.4	38.9	18.7	57.6	35 800	42.3	38.8	18.9	57.7	36 400
Non ou non réponse	82.1	13.0	4.9	17.9	5 099 300	82.1	13.0	4.9	17.9	5 206 200
TABAC REGULIER OU PSYCHOTROPES OU DROGUES ILLEGALES										
Au moins un des trois (2)	64.0	23.3	12.6	36.0	1 245 200	64.0	23.3	12.7	36.0	1 263 900
Aucun des trois	87.3	10.3	2.5	12.7	3 548 000	87.3	10.2	2.5	12.7	3 631 800
Patient inclassable	90.0	6.9	3.0	10.0	341 900	90.0	6.9	3.1	10.0	346 900
Ensemble des patients	81.8	13.2	5.0	18.2	5 135 100	81.8	13.2	5.0	18.2	5 242 600

(1) Mentionné par le médecin soit en motif de recours le jour de l'enquête, soit en autre problème de santé connu.

(2) Ce chiffre est inférieur à la somme des trois autres pris individuellement car un même patient peut cumuler plusieurs types de produits.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-15 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon l'attitude vis-à-vis des autres substances psycho-actives

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
HABITUDES TABAGIQUES						
Non fumeur	25.3	40.8	2 235 700	25.2	41.0	2 300 600
Ex fumeur	66.8	46.7	976 200	66.8	46.7	988 500
Fumeur occasionnel	50.0	48.2	370 400	50.0	48.2	377 400
Fumeur régulier	52.7	52.2	1 209 400	52.6	52.2	1 227 700
Dont fumant quotidiennement						
1 à 5 cigarettes	50.1	41.3	163 500	49.6	41.2	167 600
6 à 20 cigarettes	51.2	50.2	837 600	51.3	50.3	849 000
21 à 40 cigarettes	60.5	71.3	176 500	60.6	71.4	178 700
plus de 40 cigarettes	65.5	73.3	8 200	64.9	72.9	8 500
non réponse	58.3	47.7	23 600	58.4	47.9	23 900
Patient inclassable	31.0	42.8	343 400	31.0	42.9	348 400
ABUS OU DEPENDANCE AUX PSYCHOTROPES (1)						
Oui	41.0	58.1	64 100	41.3	57.9	65 100
Non ou non réponse	41.8	45.1	5 071 000	41.7	45.2	5 177 500
ABUS OU DEPENDANCE AUX DROGUES ILLEGALES (1)						
Oui	78.5	34.4	35 800	78.4	34.2	36 400
Non ou non réponse	41.5	45.4	5 099 300	41.4	45.4	5 206 200
TABAC REGULIER OU PSYCHOTROPES OU DROGUES ILLEGALES						
Au moins un des trois (2)	52.0	52.2	1 245 200	52.0	52.2	1 263 900
Aucun des trois	39.3	43.1	3 548 000	39.1	43.2	3 631 800
Patient inclassable	31.0	42.8	341 900	31.0	42.9	346 900
Ensemble des patients	41.8	45.3	5 135 100	41.7	45.4	5 242 600

(1) Mentionné par le médecin soit en motif de recours le jour de l'enquête, soit en autre problème de santé connu.

(2) Ce chiffre est inférieur à la somme des trois autres pris individuellement car un même patient peut cumuler plusieurs types de produits.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-16 : Répartition en pourcentage des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon le risque d'alcoolisation excessive et la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Ensemble des patients
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL EN MEDECINE GENERALE										
Prise en charge passée	0.0	8.4	15.1	10.2	1.9	0.0	8.4	15.4	10.3	1.9
Prise en charge en cours	0.0	6.0	32.3	13.2	2.4	0.0	5.9	32.0	13.1	2.4
Prise en charge proposée	0.0	15.6	36.8	21.4	3.9	0.0	15.5	36.7	21.3	3.9
Sans objet	100.0	56.3	2.5	41.6	89.4	100.0	56.4	2.6	41.7	89.4
Ne sait pas / Non réponse	0.0	13.8	13.3	13.6	2.5	0.0	13.8	13.3	13.6	2.5
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE STRUCTURE SPECIALISEE										
Prise en charge passée	0.0	3.6	15.0	6.7	1.2	0.0	3.5	15.1	6.7	1.2
Prise en charge en cours	0.0	0.5	8.0	2.5	0.5	0.0	0.5	7.9	2.5	0.5
Prise en charge proposée	0.0	3.3	27.4	9.9	1.8	0.0	3.3	27.3	9.9	1.8
Sans objet	100.0	56.3	2.5	41.6	89.4	100.0	56.4	2.6	41.7	89.4
Ne sait pas / Non réponse	0.0	36.4	47.1	39.3	7.1	0.0	36.2	47.1	39.2	7.1
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE ASSOCIATION D'ANCIENS BUVEURS										
Prise en charge passée	0.0	1.4	5.5	2.5	0.5	0.0	1.4	5.5	2.5	0.5
Prise en charge en cours	0.0	0.3	2.7	1.0	0.2	0.0	0.3	2.7	1.0	0.2
Prise en charge proposée	0.0	2.9	24.4	8.8	1.6	0.0	2.9	24.3	8.8	1.6
Sans objet	100.0	56.3	2.5	41.6	89.4	100.0	56.4	2.6	41.7	89.4
Ne sait pas / Non réponse	0.0	39.1	64.9	46.2	8.4	0.0	39.0	64.9	46.1	8.4
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE										
Patients ayant bénéficié d'au moins une prise en charge passée, en cours ou proposée (1)	0.0	31.0	88.5	46.7	8.5	0.0	30.9	88.4	46.7	8.5
Patients pour lesquels la réponse est "sans objet" (2)	100.0	56.3	2.5	41.6	89.4	100.0	56.4	2.6	41.7	89.4
Patients pour lesquels il n'y a pas de réponse (3)	0.0	12.7	9.0	11.7	2.1	0.0	12.7	9.0	11.7	2.1
Nombre de patients	4 201 900	678 300	254 900	933 200	5 135 100	4 289 800	691 300	261 500	952 800	5 242 600

(1) Ce chiffre est inférieur à la somme des prises en charge prises individuellement car un même patient peut bénéficier de plusieurs types de prise en charge.

(2) Pour les patients classés à risque d'alcoolisation excessive, il s'agit de patients jugés sans problème d'alcool par le médecin mais classés à risque par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool.

(3) Inclut les patients n'ayant jamais fait l'objet d'une prise en charge spécifique.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-17 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées

	France métropolitaine					France entière				
	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients	Patients sans risque d'alcoolisation excessive	Patients à risque d'alcoolisation excessive non dépendants	Patients dépendants à l'alcool	Ensemble des patients à risque d'alcoolisation excessive	Nombre de patients
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL EN MEDECINE GENERALE										
Prise en charge passée	0.0	59.6	40.4	100.0	95 300	0.0	58.9	41.1	100.0	98 100
Prise en charge en cours	0.0	32.9	67.1	100.0	122 800	0.0	32.8	67.2	100.0	124 600
Prise en charge proposée	0.0	53.0	47.0	100.0	199 600	0.0	52.8	47.2	100.0	203 300
Sans objet	91.5	8.3	0.1	8.5	4 590 100	91.5	8.3	0.1	8.5	4 686 700
Ne sait pas / Non réponse	0.0	73.5	26.5	100.0	127 300	0.0	73.3	26.7	100.0	129 900
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE STRUCTURE SPECIALISEE										
Prise en charge passée	0.0	38.7	61.3	100.0	62 500	0.0	38.3	61.7	100.0	64 100
Prise en charge en cours	0.0	13.1	86.9	100.0	23 500	0.0	13.4	86.6	100.0	23 900
Prise en charge proposée	0.0	24.3	75.7	100.0	92 100	0.0	24.4	75.6	100.0	94 300
Sans objet	91.5	8.3	0.1	8.5	4 590 100	91.5	8.3	0.1	8.5	4 686 700
Ne sait pas / Non réponse	0.0	67.3	32.7	100.0	366 900	0.0	67.1	32.9	100.0	373 600
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE ASSOCIATION D'ANCIENS BUVEURS										
Prise en charge passée	0.0	40.3	59.7	100.0	23 400	0.0	39.8	60.2	100.0	23 900
Prise en charge en cours	0.0	23.1	76.9	100.0	8 900	0.0	23.3	76.7	100.0	9 100
Prise en charge proposée	0.0	23.9	76.1	100.0	81 800	0.0	24.0	76.0	100.0	83 600
Sans objet	91.5	8.3	0.1	8.5	4 590 100	91.5	8.3	0.1	8.5	4 686 700
Ne sait pas / Non réponse	0.0	61.6	38.4	100.0	430 900	0.0	61.4	38.6	100.0	439 300
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE										
Patients ayant bénéficié d'au moins une prise en charge passée, en cours ou proposée (1)	0.0	48.2	51.8	100.0	435 800	0.0	48.0	52.0	100.0	444 600
Patients pour lesquels la réponse est "sans objet" (2)	91.5	8.3	0.1	8.5	4 590 100	91.5	8.3	0.1	8.5	4 686 700
Patients pour lesquels il n'y a pas de réponse (3)	0.0	79.0	21.0	100.0	109 200	0.0	78.8	21.2	100.0	111 300
Ensemble des patients	81.8	13.2	5.0	18.2	5 135 100	81.8	13.2	5.0	18.2	5 242 600

(1) Ce chiffre est inférieur à la somme des prises en charge prises individuellement car un même patient peut bénéficier de plusieurs types de prise en charge.

(2) Pour les patients classés à risque d'alcoolisation excessive, il s'agit de patients jugés sans problème d'alcool par le médecin mais classés à risque par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool.

(3) Inclut les patients n'ayant jamais fait l'objet d'une prise en charge spécifique.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-18 : Principales caractéristiques démographiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 selon la prise en charge du problème d'alcool par des structures spécialisées

	France métropolitaine			France entière		
	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients	Proportion d'hommes (en %)	Proportion de patients âgés de 35 à 64 ans (en %)	Nombre de patients
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL EN MEDECINE GENERALE						
Prise en charge passée	66.2	63.7	95 300	66.2	63.7	98 100
Prise en charge en cours	72.7	69.8	122 800	72.8	69.7	124 600
Prise en charge proposée	77.6	63.7	199 600	77.7	63.8	203 300
Sans objet	38.1	43.1	4 590 100	37.9	43.2	4 686 700
Ne sait pas / Non réponse	72.5	58.0	127 300	72.4	58.1	129 900
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE STRUCTURE SPECIALISEE						
Prise en charge passée	65.2	72.5	62 500	65.2	72.5	64 100
Prise en charge en cours	61.7	78.4	23 500	62.1	78.3	23 900
Prise en charge proposée	71.3	70.2	92 100	71.5	70.1	94 300
Sans objet	38.1	43.1	4 590 100	37.9	43.2	4 686 700
Ne sait pas / Non réponse	75.9	59.7	366 900	75.9	59.7	373 600
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL PAR UNE ASSOCIATION D'ANCIENS BUVEURS						
Prise en charge passée	62.7	75.3	23 400	62.0	74.5	23 900
Prise en charge en cours	63.1	81.7	8 900	63.8	81.6	9 100
Prise en charge proposée	70.6	72.2	81 800	70.7	72.3	83 600
Sans objet	38.1	43.1	4 590 100	37.9	43.2	4 686 700
Ne sait pas / Non réponse	74.6	61.1	430 900	74.6	61.2	439 300
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE						
Patients ayant bénéficié d'au moins une prise en charge passée, en cours ou proposée (1)	72.8	66.1	435 800	72.8	66.1	444 600
Patients pour lesquels la réponse est "sans objet" (2)	38.1	43.1	4 590 100	37.9	43.2	4 686 700
Patients pour lesquels il n'y a pas de réponse (3)	75.4	54.1	109 200	75.3	54.3	111 300
Ensemble des patients	41.8	45.3	5 135 100	41.7	45.4	5 242 600

(1) Ce chiffre est inférieur à la somme des prises en charge prises individuellement car un même patient peut bénéficier de plusieurs types de prise en charge.

(2) Pour les patients classés à risque d'alcoolisation excessive, il s'agit de patients jugés sans problème d'alcool par le médecin mais classés à risque par leurs réponses aux questions du test DETA ou sur leur consommation d'alcool.

(3) Inclut les patients n'ayant jamais fait l'objet d'une prise en charge spécifique.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-19 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Hommes											
Alsace	10.5	19.2	21.9	24.5	24.0	23.1	17.6	14.0	21.2	20.6	63 800
Aquitaine	35.5	41.0	37.5	31.7	24.8	20.7	15.9	7.8	26.5	27.5	116 500
Auvergne	23.8	28.0	24.5	28.3	21.7	21.4	22.5	9.7	23.4	23.4	49 500
Basse-Normandie	31.2	23.8	25.9	28.3	34.9	22.0	10.8	5.0	24.7	23.6	45 600
Bourgogne	20.4	19.9	29.9	30.7	23.5	22.6	10.6	23.9	22.9	23.0	57 000
Bretagne	38.0	34.7	37.1	34.5	36.7	24.5	16.7	17.7	30.6	30.3	112 000
Centre	11.8	18.0	28.9	26.6	31.1	22.6	20.2	14.2	23.2	23.1	82 800
Champagne-Ardenne	25.1	25.6	20.9	21.9	17.2	21.4	9.2	13.3	20.0	19.5	51 900
Corse	16.2	21.7	17.6	19.7	18.1	18.8	8.2	18.0	17.5	17.4	10 200
Franche-Comté	18.5	28.8	33.1	26.8	25.1	14.2	11.2	0.0	21.9	21.2	41 500
Haute-Normandie	15.3	21.5	23.5	23.7	26.2	21.6	15.1	0.0	21.4	20.2	65 500
Ile-de-France	18.7	21.5	22.3	27.4	19.3	17.5	14.1	12.9	20.8	19.8	338 500
Languedoc-Roussillon	22.5	27.4	25.1	25.2	27.6	17.7	11.0	13.2	21.6	21.7	103 600
Limousin	26.9	25.1	16.9	27.7	26.1	27.4	19.1	16.6	24.0	23.7	31 700
Lorraine	29.8	20.9	19.8	19.4	29.2	13.0	14.7	9.0	20.0	19.3	86 800
Midi-Pyrénées	38.0	29.7	24.8	26.3	25.3	11.7	15.4	8.7	21.4	22.1	103 400
Nord-Pas-de-Calais	11.0	22.3	20.9	28.2	25.9	18.7	15.9	13.6	21.8	20.7	175 000
Pays-de-la-Loire	39.4	37.0	33.7	30.5	26.6	29.9	16.3	0.0	29.6	28.0	115 900
Picardie	19.3	23.3	22.5	23.3	29.8	20.0	8.6	7.3	21.5	20.3	75 200
Poitou-Charentes	23.1	25.3	27.6	27.0	24.6	20.7	8.5	4.5	21.3	21.3	70 700
Provence-Alpes-Côte d'Azur	22.7	27.8	33.9	26.9	23.4	19.5	19.1	7.9	24.3	23.7	170 400
Rhône-Alpes	9.2	24.1	29.2	28.2	25.9	25.3	17.1	4.2	23.4	22.7	178 000
France métropolitaine	22.0	25.1	26.4	27.2	25.3	20.5	15.0	9.9	23.1	22.3	2 145 500
Guadeloupe	8.4	15.7	23.6	24.5	22.6	24.3	14.2	20.1	20.9	20.2	7 300
Martinique	24.9	19.8	31.1	18.8	23.3	19.4	12.9	60.3	22.5	23.5	7 400
Guyane	16.3	29.7	20.2	18.1	17.1	13.6	27.6	0.0	20.6	19.0	2 600
La Réunion	18.9	32.6	33.2	36.5	25.7	40.6	17.0	19.3	29.9	29.9	19 900
Départements d'Outre-Mer	18.4	27.2	29.7	29.2	24.1	30.3	15.9	23.6	26.0	25.6	37 200
France entière	21.9	25.2	26.4	27.2	25.2	20.7	15.0	10.0	23.1		2 182 700
Femmes											
Alsace	7.8	4.2	6.2	7.7	9.7	3.6	1.0	2.7	5.4	5.4	94 800
Aquitaine	9.6	2.0	7.3	7.0	8.4	4.3	0.5	1.2	5.1	5.1	165 200
Auvergne	4.5	2.0	5.4	4.9	5.8	0.6	5.0	1.7	3.8	3.8	65 200
Basse-Normandie	5.7	4.0	5.1	10.1	8.2	6.4	3.9	8.0	6.2	6.4	63 800
Bourgogne	5.1	7.2	4.7	6.9	5.1	5.0	4.6	0.0	5.2	5.2	77 200
Bretagne	6.2	9.2	9.6	12.7	6.9	9.4	1.8	7.8	7.8	8.3	139 400
Centre	3.4	3.6	6.4	5.7	5.7	4.9	2.7	5.2	4.7	4.8	111 300
Champagne-Ardenne	5.0	6.3	4.6	6.0	4.7	3.0	0.8	0.0	4.1	4.0	64 600
Corse	2.8	2.5	6.9	6.9	4.9	2.6	7.2	4.1	5.0	4.9	10 900
Franche-Comté	5.6	5.5	9.5	5.2	6.4	1.7	2.7	0.0	4.9	4.8	54 400
Haute-Normandie	3.0	4.7	6.9	9.2	5.9	3.1	3.0	1.2	5.1	5.0	97 100
Ile-de-France	6.3	6.2	6.1	12.6	11.1	5.6	3.6	0.0	7.1	7.0	545 300
Languedoc-Roussillon	2.4	11.6	9.3	7.6	4.4	6.3	1.5	5.2	6.3	6.4	135 700
Limousin	5.5	4.8	5.1	9.1	5.0	0.4	0.5	0.0	3.9	3.9	40 900
Lorraine	0.7	7.6	10.7	5.2	5.9	1.6	2.8	0.0	5.1	4.8	114 200
Midi-Pyrénées	4.6	8.2	9.6	8.9	7.9	5.2	5.6	4.4	7.0	7.1	145 700
Nord-Pas-de-Calais	4.2	5.1	11.0	13.3	10.0	6.9	7.1	2.6	8.5	8.2	236 300
Pays-de-la-Loire	3.9	7.0	4.4	6.7	7.4	5.4	3.1	0.0	5.3	5.2	161 200
Picardie	3.1	5.6	6.9	7.5	6.1	5.4	2.6	8.6	5.8	5.7	102 300
Poitou-Charentes	4.5	5.9	3.5	7.2	2.7	5.2	1.8	2.6	4.4	4.4	86 400
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5.1	8.0	8.4	10.4	7.9	3.3	4.7	3.2	6.6	6.7	228 000
Rhône-Alpes	4.6	9.7	5.8	11.1	4.4	3.2	3.2	3.1	6.1	5.9	249 700
France métropolitaine	5.0	6.5	7.2	9.6	7.3	4.7	3.3	2.4	6.2	6.1	2 989 600
Guadeloupe	2.9	5.0	4.3	6.9	4.7	2.0	10.7	2.8	5.0	5.1	11 700
Martinique	5.2	2.9	4.8	4.7	3.4	2.9	6.7	10.3	4.4	4.6	14 300
Guyane	2.1	3.2	2.7	7.1	7.2	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	3 900
La Réunion	4.5	4.6	7.4	5.2	3.9	6.9	2.3	0.0	5.2	4.8	40 400
Départements d'Outre-Mer	4.3	4.2	6.0	5.5	4.1	4.9	5.3	3.5	4.9	4.9	70 300
France entière	5.0	6.4	7.1	9.5	7.3	4.7	3.3	2.4	6.1		3 059 900

... / ...


Tableau II-19 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation (*suite et fin*)

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Les deux sexes											
Alsace	8.9	10.1	12.6	14.8	16.4	11.9	6.2	5.4	11.7	11.5	158 600
Aquitaine	21.2	15.8	18.4	18.1	15.1	11.8	7.1	3.2	14.0	14.2	281 700
Auvergne	11.4	12.6	13.1	15.7	13.0	10.5	12.2	4.7	12.2	12.2	114 700
Basse-Normandie	15.9	10.7	14.3	18.3	21.4	13.4	6.6	7.4	13.9	13.9	109 400
Bourgogne	10.8	11.3	15.1	17.6	14.0	13.1	7.2	9.6	12.7	12.8	134 200
Bretagne	17.4	20.2	23.4	23.1	20.7	17.1	6.9	12.0	18.0	18.1	251 400
Centre	7.3	9.1	15.1	15.7	17.5	13.2	9.6	7.7	12.6	12.7	194 100
Champagne-Ardenne	14.6	14.2	11.7	13.5	11.0	11.7	4.1	3.7	11.2	10.9	116 500
Corse	9.1	11.0	11.6	12.0	13.0	11.6	7.7	9.4	11.0	10.9	21 100
Franche-Comté	10.8	14.4	19.2	15.9	15.0	7.6	6.0	0.0	12.2	12.0	95 900
Haute-Normandie	7.1	11.1	13.5	15.7	15.7	10.7	7.4	0.9	11.7	11.3	162 600
Ile-de-France	11.2	12.0	12.8	18.0	15.1	10.0	7.1	2.6	12.4	11.8	883 800
Languedoc-Roussillon	10.5	17.4	15.3	16.3	15.1	11.8	5.6	7.8	12.9	13.0	239 300
Limousin	15.2	13.4	10.5	17.2	14.5	12.5	8.4	5.6	12.7	12.6	72 600
Lorraine	11.8	14.2	14.5	11.6	15.6	6.8	7.0	3.7	11.5	10.9	201 000
Midi-Pyrénées	16.4	15.1	16.1	17.3	15.6	8.0	9.6	5.8	13.0	13.2	249 100
Nord-Pas-de-Calais	6.9	11.9	15.3	20.6	16.5	12.5	9.8	6.0	14.1	13.5	411 300
Pays-de-la-Loire	21.5	17.0	17.4	16.8	15.7	17.0	8.0	0.0	15.5	14.9	277 100
Picardie	10.3	12.9	13.5	14.7	15.6	12.1	4.8	8.1	12.4	11.9	177 500
Poitou-Charentes	12.7	13.6	14.2	16.2	13.9	12.1	5.2	3.2	12.0	12.1	157 100
Provence-Alpes-Côte d'Azur	10.9	16.5	19.8	18.0	15.8	10.1	10.2	4.5	14.2	14.0	398 400
Rhône-Alpes	6.4	15.3	14.4	18.9	14.0	12.5	9.7	3.5	13.3	13.0	427 700
France métropolitaine	11.8	13.7	15.1	17.5	15.6	11.7	7.8	4.6	13.2	12.9	5 135 100
Guadeloupe	5.0	8.3	12.0	14.3	12.0	10.6	11.9	11.2	11.1	11.1	19 000
Martinique	12.5	8.0	13.1	9.2	11.1	10.5	8.7	17.4	10.6	10.7	21 700
Guyane	7.2	12.8	9.8	11.6	11.3	7.8	10.3	0.0	10.5	9.6	6 500
La Réunion	9.4	11.7	15.6	16.2	13.1	18.8	8.0	4.3	13.3	13.3	60 300
Départements d'Outre-Mer	9.2	10.6	14.1	14.1	12.3	14.8	9.1	9.3	12.2	12.2	107 500
France entière	11.7	13.6	15.1	17.4	15.5	11.8	7.8	4.7	13.2		5 242 600

(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Carte II-1 : Proportion standardisée (1) de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive non dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation



(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-20 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés alcoolo-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Hommes											
Alsace	4.1	2.8	11.9	14.4	14.4	8.9	14.3	0.0	10.3	10.0	63 800
Aquitaine	0.0	1.6	8.1	7.6	9.8	4.6	1.8	2.3	5.2	5.0	116 500
Auvergne	8.4	1.2	20.0	16.8	20.1	9.2	3.1	5.0	11.6	11.2	49 500
Basse-Normandie	2.6	3.9	10.7	15.1	7.1	13.1	4.9	3.9	9.1	8.7	45 600
Bourgogne	0.0	6.0	14.4	10.4	12.8	8.5	6.3	0.0	8.8	8.5	57 000
Bretagne	2.8	3.0	8.8	13.8	12.7	9.5	10.1	3.1	9.2	8.9	112 000
Centre	0.0	3.4	13.6	12.1	11.2	9.0	1.9	0.0	7.8	7.6	82 800
Champagne-Ardenne	0.0	2.5	13.7	14.6	17.9	8.0	1.0	0.0	9.5	8.5	51 900
Corse	0.0	2.0	4.3	9.7	10.3	4.5	2.5	0.0	5.4	4.9	10 200
Franche-Comté	2.0	3.8	9.7	13.1	12.3	10.5	5.8	4.8	9.0	8.6	41 500
Haute-Normandie	0.0	8.2	13.2	16.0	14.0	8.5	1.9	0.0	10.0	9.0	65 500
Ile-de-France	2.0	4.2	3.9	8.0	7.6	8.8	5.8	0.0	5.7	5.8	338 500
Languedoc-Roussillon	8.4	9.9	15.4	16.3	11.5	6.6	2.0	0.0	9.7	9.5	103 600
Limousin	0.0	3.4	7.9	11.1	9.2	7.0	4.1	0.0	6.6	6.3	31 700
Lorraine	5.2	2.9	14.0	10.6	9.9	7.5	1.3	0.0	7.6	7.2	86 800
Midi-Pyrénées	0.0	3.7	14.7	15.7	7.9	5.8	6.5	0.0	8.5	7.9	103 400
Nord-Pas-de-Calais	3.0	8.7	22.3	23.8	16.5	17.9	3.3	0.0	16.1	14.0	175 000
Pays-de-la-Loire	0.0	2.3	12.0	14.1	14.0	7.2	5.4	0.0	8.3	8.1	115 900
Picardie	1.4	8.1	11.0	12.3	13.4	7.0	8.6	0.0	9.1	8.8	75 200
Poitou-Charentes	1.5	3.5	13.2	12.0	15.6	12.1	12.8	2.6	10.9	10.4	70 700
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.0	7.7	3.4	12.3	13.2	7.3	1.8	5.8	7.8	7.0	170 400
Rhône-Alpes	1.8	6.5	9.3	7.6	8.3	8.2	5.8	0.0	7.0	6.8	178 000
France métropolitaine	1.9	5.1	10.6	13.0	11.7	8.9	5.1	1.3	8.6	8.2	2 145 500
Guadeloupe	0.0	8.1	10.7	16.0	13.2	15.9	8.8	0.0	11.1	10.8	7 300
Martinique	1.7	2.3	12.3	10.1	27.1	15.3	18.8	0.0	12.4	12.6	7 400
Guyane	3.4	3.5	8.3	11.7	26.0	27.2	4.1	0.0	10.7	12.5	2 600
La Réunion	2.9	19.5	19.4	19.5	16.4	8.8	10.3	0.0	14.4	13.6	19 900
Départements d'Outre-Mer	2.4	12.8	15.3	16.4	18.6	12.9	11.9	0.0	13.1	12.9	37 200
France entière	1.9	5.3	10.7	13.1	11.8	8.9	5.1	1.3	8.7		2 182 700
Femmes											
Alsace	0.5	0.0	2.7	2.1	3.1	1.5	2.0	1.2	1.7	1.7	94 800
Aquitaine	1.2	0.0	1.5	1.4	1.5	0.3	0.3	0.0	0.8	0.8	165 200
Auvergne	0.0	0.4	3.5	2.8	4.5	1.8	0.0	0.0	1.9	1.9	65 200
Basse-Normandie	0.0	0.0	5.1	4.5	2.1	0.5	1.2	0.0	1.9	1.9	63 800
Bourgogne	0.0	0.0	2.5	6.5	1.7	0.7	0.5	2.9	1.8	2.0	77 200
Bretagne	0.8	2.9	5.5	3.7	2.7	2.3	0.0	3.8	2.5	2.8	139 400
Centre	0.0	0.0	1.4	4.1	1.8	1.9	0.8	0.0	1.4	1.5	111 300
Champagne-Ardenne	2.3	0.8	2.6	6.6	5.6	3.2	1.5	0.0	3.2	3.2	64 600
Corse	0.0	1.6	1.7	6.7	0.0	0.8	0.0	0.0	1.7	1.6	10 900
Franche-Comté	0.7	1.2	2.5	0.7	2.3	0.0	0.4	0.0	1.1	1.0	54 400
Haute-Normandie	2.4	0.7	2.2	4.8	3.3	3.2	0.5	1.2	2.4	2.5	97 100
Ile-de-France	0.0	0.7	3.3	4.9	7.2	3.4	1.1	0.0	2.8	3.0	545 300
Languedoc-Roussillon	2.3	2.5	3.2	6.1	3.2	2.1	0.5	0.0	2.7	2.8	135 700
Limousin	0.0	0.9	4.0	3.7	0.4	0.3	1.1	0.0	1.5	1.5	40 900
Lorraine	0.0	0.8	4.6	1.2	6.9	0.0	3.2	0.0	2.4	2.3	114 200
Midi-Pyrénées	0.0	2.0	3.6	4.4	4.3	1.5	0.6	1.0	2.4	2.4	145 700
Nord-Pas-de-Calais	0.0	0.0	3.1	8.1	6.7	2.2	2.8	0.0	3.5	3.4	236 300
Pays-de-la-Loire	0.0	0.0	4.3	1.3	4.7	0.2	0.7	0.0	1.6	1.6	161 200
Picardie	0.0	1.7	4.9	4.6	3.4	1.1	0.4	0.0	2.6	2.3	102 300
Poitou-Charentes	0.0	2.1	6.3	5.0	3.6	2.4	0.0	0.0	2.7	2.9	86 400
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.0	0.5	3.2	4.3	3.7	1.2	0.9	1.8	2.1	2.1	228 000
Rhône-Alpes	2.9	1.4	3.6	4.3	2.7	1.0	0.0	4.7	2.4	2.4	249 700
France métropolitaine	0.7	0.8	3.4	4.4	4.1	1.7	0.9	0.8	2.3	2.3	2 989 600
Guadeloupe	0.0	1.4	0.9	2.2	4.3	3.7	1.8	3.9	2.1	2.4	11 700
Martinique	0.0	0.2	1.7	1.2	5.1	2.1	9.6	0.0	2.3	2.8	14 300
Guyane	0.0	0.0	1.6	0.3	0.0	2.5	0.0	0.0	0.5	0.7	3 900
La Réunion	0.0	2.2	5.7	4.4	1.8	1.8	1.5	0.0	2.7	2.5	40 400
Départements d'Outre-Mer	0.0	1.6	3.8	3.0	3.0	2.3	3.9	0.8	2.4	2.6	70 300
France entière	0.6	0.9	3.4	4.4	4.1	1.7	0.9	0.8	2.3		3 059 900

... / ...


Tableau II-20 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés alcoolo-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation (suite et fin)

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Les deux sexes											
Alsace	2.0	1.1	6.4	7.3	8.4	4.6	5.9	0.9	5.2	5.1	158 600
Aquitaine	0.7	0.6	3.9	4.2	4.9	2.3	1.0	0.7	2.6	2.6	281 700
Auvergne	3.0	0.8	10.2	9.3	11.6	5.3	1.3	1.9	6.1	6.0	114 700
Basse-Normandie	1.0	1.3	7.6	9.3	4.6	6.1	2.7	0.8	4.9	4.8	109 400
Bourgogne	0.0	2.0	7.4	8.3	7.0	4.3	3.0	1.7	4.8	4.8	134 200
Bretagne	1.5	3.0	7.1	8.5	7.3	5.9	3.5	3.5	5.5	5.5	251 400
Centre	0.0	1.3	6.1	7.9	6.2	5.3	1.2	0.0	4.1	4.2	194 100
Champagne-Ardenne	1.2	1.5	7.4	10.4	11.7	5.4	1.3	0.0	6.0	5.7	116 500
Corse	0.0	1.7	2.8	7.9	6.3	2.9	1.1	0.0	3.5	3.3	21 100
Franche-Comté	1.2	2.2	5.5	6.8	6.9	5.0	2.5	1.6	4.5	4.5	95 900
Haute-Normandie	1.6	3.5	6.5	9.8	8.5	5.4	1.0	0.9	5.5	5.3	162 600
Ile-de-France	0.8	2.0	3.5	6.0	7.4	5.4	2.7	0.0	3.9	4.1	883 800
Languedoc-Roussillon	4.7	5.2	7.9	11.1	7.0	4.3	1.2	0.0	5.7	5.7	239 300
Limousin	0.0	2.0	5.8	6.9	4.4	3.3	2.4	0.0	3.7	3.6	72 600
Lorraine	2.0	1.9	8.5	5.4	8.2	3.4	2.5	0.0	4.7	4.4	201 000
Midi-Pyrénées	0.0	2.5	8.3	9.9	5.9	3.3	3.1	0.7	4.9	4.9	249 100
Nord-Pas-de-Calais	1.2	3.4	11.4	15.8	10.8	9.6	3.0	0.0	8.9	8.1	411 300
Pays-de-la-Loire	0.0	0.8	7.8	6.7	8.7	3.5	2.5	0.0	4.4	4.4	277 100
Picardie	0.6	4.3	7.5	8.1	7.4	3.8	3.3	0.0	5.3	5.0	177 500
Poitou-Charentes	0.6	2.7	9.4	8.2	9.8	6.7	6.4	0.7	6.4	6.4	157 100
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.0	3.6	3.3	8.0	8.5	3.8	1.3	2.9	4.5	4.3	398 400
Rhône-Alpes	2.5	3.4	5.7	5.8	5.2	4.0	2.7	3.1	4.3	4.3	427 700
France métropolitaine	1.2	2.5	6.4	8.2	7.6	4.9	2.5	0.9	5.0	4.8	5 135 100
Guadeloupe	0.0	3.4	4.8	8.0	7.9	8.4	4.2	2.0	5.6	5.6	19 000
Martinique	0.6	0.8	5.0	4.1	13.6	8.2	12.6	0.0	5.7	6.4	21 700
Guyane	1.2	1.3	4.4	5.2	10.7	16.7	1.5	0.0	4.6	6.3	6 500
La Réunion	1.0	6.6	10.0	9.7	8.0	4.3	4.9	0.0	6.6	6.3	60 300
Départements d'Outre-Mer	0.8	4.7	7.7	7.9	9.4	6.5	6.8	0.6	6.1	6.3	107 500
France entière	1.1	2.6	6.4	8.2	7.6	4.9	2.5	0.9	5.0		5 242 600

(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Carte II-2 : Proportion standardisée (1) de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés alcoolo-dépendants selon le sexe et la région d'hospitalisation



(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-21 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Hommes											
Alsace	14.7	22.0	33.8	38.9	38.4	32.0	31.9	14.0	31.4	30.6	63 800
Aquitaine	35.5	42.6	45.6	39.3	34.5	25.4	17.8	10.1	31.6	32.6	116 500
Auvergne	32.2	29.3	44.5	45.1	41.7	30.6	25.6	14.7	34.9	34.6	49 500
Basse-Normandie	33.8	27.7	36.6	43.4	42.0	35.1	15.8	9.0	33.8	32.3	45 600
Bourgogne	20.4	25.9	44.3	41.1	36.3	31.1	16.9	23.9	31.7	31.5	57 000
Bretagne	40.8	37.7	45.9	48.2	49.4	34.0	26.8	20.8	39.9	39.1	112 000
Centre	11.8	21.4	42.5	38.6	42.3	31.6	22.1	14.2	31.0	30.6	82 800
Champagne-Ardenne	25.1	28.1	34.6	36.5	35.1	29.4	10.1	13.3	29.5	28.0	51 900
Corse	16.2	23.7	21.9	29.4	28.3	23.3	10.7	18.0	22.9	22.3	10 200
Franche-Comté	20.6	32.6	42.8	39.9	37.4	24.7	17.0	4.8	30.8	29.8	41 500
Haute-Normandie	15.3	29.7	36.7	39.7	40.2	30.1	17.0	0.0	31.4	29.2	65 500
Ile-de-France	20.6	25.7	26.2	35.4	26.9	26.3	19.9	12.9	26.5	25.7	338 500
Languedoc-Roussillon	30.8	37.3	40.5	41.5	39.1	24.3	13.0	13.2	31.2	31.2	103 600
Limousin	26.9	28.6	24.8	38.8	35.3	34.4	23.2	16.6	30.5	30.0	31 700
Lorraine	35.0	23.9	33.7	29.9	39.1	20.5	16.0	9.0	27.6	26.5	86 800
Midi-Pyrénées	38.0	33.4	39.5	41.9	33.3	17.5	21.9	8.7	30.0	30.1	103 400
Nord-Pas-de-Calais	14.0	31.0	43.2	52.1	42.4	36.6	19.2	13.6	37.9	34.7	175 000
Pays-de-la-Loire	39.4	39.3	45.8	44.5	40.7	37.1	21.7	0.0	37.9	36.1	115 900
Picardie	20.7	31.3	33.5	35.5	43.1	27.1	17.2	7.3	30.6	29.0	75 200
Poitou-Charentes	24.6	28.9	40.8	39.0	40.2	32.9	21.4	7.0	32.2	31.7	70 700
Provence-Alpes-Côte d'Azur	22.7	35.4	37.3	39.2	36.6	26.8	20.9	13.6	32.1	30.7	170 400
Rhône-Alpes	11.1	30.6	38.5	35.8	34.1	33.5	22.9	4.2	30.5	29.5	178 000
France métropolitaine	23.9	30.2	37.0	40.2	36.9	29.4	20.1	11.2	31.7	30.5	2 145 500
Guadeloupe	8.4	23.8	34.3	40.5	35.8	40.3	23.0	20.1	32.0	31.0	7 300
Martinique	26.6	22.2	43.4	28.9	50.4	34.7	31.7	60.3	35.0	36.1	7 400
Guyane	19.7	33.2	28.6	29.8	43.2	40.8	31.6	0.0	31.3	31.5	2 600
La Réunion	21.7	52.1	52.6	56.0	42.0	49.3	27.3	19.3	44.3	43.5	19 900
Départements d'Outre-Mer	20.8	40.0	44.9	45.6	42.6	43.2	27.7	23.6	39.1	38.5	37 200
France entière	23.8	30.4	37.1	40.3	37.0	29.6	20.1	11.3	31.8		2 182 700
Femmes											
Alsace	8.4	4.2	8.9	9.8	12.8	5.0	3.0	3.9	7.1	7.1	94 800
Aquitaine	10.8	2.0	8.9	8.3	9.8	4.6	0.9	1.2	6.0	5.9	165 200
Auvergne	4.5	2.4	9.0	7.8	10.4	2.4	5.0	1.7	5.7	5.7	65 200
Basse-Normandie	5.7	4.0	10.2	14.5	10.3	6.9	5.1	8.0	8.1	8.4	63 800
Bourgogne	5.1	7.2	7.1	13.5	6.8	5.7	5.1	2.9	7.0	7.1	77 200
Bretagne	7.0	12.1	15.1	16.4	9.6	11.7	1.8	11.6	10.3	11.0	139 400
Centre	3.4	3.6	7.8	9.8	7.5	6.8	3.5	5.2	6.1	6.3	111 300
Champagne-Ardenne	7.4	7.0	7.2	12.6	10.3	6.2	2.4	0.0	7.3	7.2	64 600
Corse	2.8	4.1	8.7	13.6	4.9	3.4	7.2	4.1	6.8	6.5	10 900
Franche-Comté	6.2	6.7	12.0	5.9	8.6	1.7	3.2	0.0	6.0	5.8	54 400
Haute-Normandie	5.4	5.4	9.1	14.0	9.3	6.3	3.5	2.4	7.5	7.5	97 100
Ile-de-France	6.3	6.9	9.4	17.5	18.3	9.0	4.7	0.0	10.0	10.0	545 300
Languedoc-Roussillon	4.7	14.1	12.5	13.7	7.6	8.4	2.1	5.2	9.0	9.1	135 700
Limousin	5.5	5.7	9.1	12.8	5.5	0.7	1.5	0.0	5.4	5.5	40 900
Lorraine	0.7	8.4	15.3	6.4	12.9	1.6	6.0	0.0	7.5	7.1	114 200
Midi-Pyrénées	4.6	10.2	13.2	13.3	12.2	6.8	6.2	5.4	9.4	9.5	145 700
Nord-Pas-de-Calais	4.2	5.1	14.1	21.5	16.7	9.0	9.9	2.6	12.0	11.6	236 300
Pays-de-la-Loire	3.9	7.0	8.7	8.0	12.1	5.7	3.8	0.0	6.9	6.8	161 200
Picardie	3.1	7.3	11.8	12.1	9.5	6.5	3.0	8.6	8.4	8.0	102 300
Poitou-Charentes	4.5	8.0	9.8	12.3	6.3	7.6	1.8	2.6	7.2	7.2	86 400
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5.1	8.4	11.6	14.7	11.6	4.5	5.7	5.0	8.7	8.8	228 000
Rhône-Alpes	7.5	11.2	9.4	15.3	7.1	4.2	3.2	7.9	8.5	8.3	249 700
France métropolitaine	5.6	7.3	10.5	14.0	11.5	6.3	4.2	3.2	8.5	8.4	2 989 600
Guadeloupe	2.9	6.4	5.2	9.0	9.0	5.7	12.5	6.7	7.1	7.5	11 700
Martinique	5.2	3.0	6.5	5.9	8.5	5.1	16.3	10.3	6.6	7.4	14 300
Guyane	2.1	3.2	4.3	7.4	7.2	2.5	0.0	0.0	4.2	3.7	3 900
La Réunion	4.5	6.8	13.0	9.6	5.7	8.7	3.8	0.0	7.9	7.3	40 400
Départements d'Outre-Mer	4.3	5.8	9.8	8.5	7.2	7.2	9.2	4.3	7.3	7.5	70 300
France entière	5.6	7.3	10.5	13.9	11.4	6.3	4.2	3.2	8.5		3 059 900

... / ...


Tableau II-21 : Proportion de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation (suite et fin)

Région d'hospitalisation	Proportion observée pour les patients âgés de :									Proportion standardisée (1) Tous âges	Nombre total de patients
	16 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Tous âges		
Les deux sexes											
Alsace	10.9	11.2	19.0	22.1	24.9	16.5	12.1	6.3	16.9	16.6	158 600
Aquitaine	21.8	16.4	22.3	22.3	20.0	14.1	8.1	3.9	16.6	16.7	281 700
Auvergne	14.4	13.4	23.2	25.0	24.6	15.8	13.5	6.6	18.3	18.2	114 700
Basse-Normandie	16.9	12.0	21.9	27.6	26.0	19.4	9.3	8.2	18.8	18.8	109 400
Bourgogne	10.8	13.2	22.5	25.9	21.0	17.4	10.1	11.3	17.5	17.6	134 200
Bretagne	18.9	23.2	30.5	31.5	28.0	23.0	10.4	15.5	23.4	23.6	251 400
Centre	7.3	10.4	21.2	23.6	23.6	18.5	10.8	7.7	16.8	16.8	194 100
Champagne-Ardenne	15.8	15.7	19.1	23.9	22.7	17.1	5.4	3.7	17.2	16.5	116 500
Corse	9.1	12.7	14.5	19.8	19.2	14.5	8.8	9.4	14.6	14.3	21 100
Franche-Comté	12.0	16.6	24.7	22.8	21.9	12.7	8.6	1.6	16.7	16.4	95 900
Haute-Normandie	8.7	14.6	20.0	25.5	24.2	16.0	8.4	1.8	17.1	16.6	162 600
Ile-de-France	11.9	14.0	16.3	24.0	22.5	15.4	9.8	2.6	16.3	15.9	883 800
Languedoc-Roussillon	15.2	22.7	23.2	27.5	22.1	16.0	6.8	7.8	18.6	18.7	239 300
Limousin	15.2	15.3	16.3	24.2	18.8	15.8	10.8	5.6	16.4	16.2	72 600
Lorraine	13.7	16.1	22.9	17.0	23.8	10.2	9.5	3.7	16.2	15.4	201 000
Midi-Pyrénées	16.4	17.7	24.5	27.2	21.6	11.3	12.7	6.4	17.9	18.1	249 100
Nord-Pas-de-Calais	8.1	15.4	26.7	36.4	27.3	22.1	12.8	6.0	23.0	21.6	411 300
Pays-de-la-Loire	21.5	17.7	25.2	23.5	24.4	20.5	10.4	0.0	19.9	19.3	277 100
Picardie	10.9	17.2	20.9	22.8	23.0	15.9	8.0	8.1	17.8	16.9	177 500
Poitou-Charentes	13.4	16.3	23.6	24.4	23.7	18.9	11.6	3.9	18.4	18.5	157 100
Provence-Alpes-Côte d'Azur	10.9	20.1	23.0	26.0	24.4	13.9	11.5	7.4	18.7	18.3	398 400
Rhône-Alpes	8.9	18.8	20.1	24.7	19.2	16.5	12.5	6.6	17.7	17.3	427 700
France métropolitaine	12.9	16.2	21.5	25.7	23.2	16.6	10.3	5.6	18.2	17.8	5 135 100
Guadeloupe	5.0	11.7	16.8	22.3	19.9	19.1	16.1	13.2	16.7	16.7	19 000
Martinique	13.2	8.8	18.1	13.2	24.6	18.7	21.3	17.4	16.3	17.2	21 700
Guyane	8.4	14.1	14.2	16.8	22.0	24.5	11.8	0.0	15.1	15.9	6 500
La Réunion	10.3	18.3	25.7	25.9	21.1	23.1	12.9	4.3	19.9	19.6	60 300
Départements d'Outre-Mer	10.1	15.3	21.7	22.1	21.7	21.3	15.8	9.8	18.3	18.6	107 500
France entière	12.8	16.2	21.5	25.6	23.1	16.6	10.4	5.6	18.2	17.8	5 242 600

(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Carte II-3 : Proportion standardisée (1) de patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 classés à risque d'alcoolisation excessive selon le sexe et la région d'hospitalisation



(1) Population de référence : ensemble des hospitalisés un jour donné et un sixième des patients vus une semaine donnée par les médecins généralistes répartis en tranches décennales avec comme première tranche les 16-24 ans et comme dernière tranche les 85 ans ou plus.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS, enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Tableau II-22 : Effet (1) des caractéristiques des patients âgés de 16 ans ou plus vus par les médecins généralistes libéraux en consultation ou en visite une semaine donnée en 2000 sur le risque d'alcoolisation excessive (2)

	Coefficients	Odds ratios		Coefficients	Odds ratios
Constante	-2.65	référence	HOSPITALISATION D'AU MOINS 24 HEURES DANS LES 12		
TYPE D'ACTE			DERNIERS MOIS EN RAISON D'UN ACCIDENT		
Consultation	référence	référence	Oui	0.60	1.82
Visite	0.30	1.35	Non	référence	référence
SEXE			NSP / NR	non significatif	non significatif
Homme	1.64	5.18	AU MOINS UN ARRET DE TRAVAIL PRESCRIT DANS LES		
Femme	référence	référence	12 DERNIERS MOIS		
AGE			Oui	0.36	1.44
16 à 24 ans	-0.32	0.72	Non	référence	référence
25 à 34 ans	référence	référence	NSP / NR	0.23	1.25
35 à 44 ans	0.39	1.48	PATIENT EN INVALIDITE OU LONGUE MALADIE		
45 à 54 ans	0.57	1.76	Oui	0.19	1.21
55 à 64 ans	0.38	1.46	Non	référence	référence
65 à 74 ans	non significatif	non significatif	NSP / NR	non significatif	non significatif
75 à 84 ans	-0.63	0.53	EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU TITRE D'UNE		
85 ans ou plus	-1.30	0.27	AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)		
SITUATION PAR RAPPORT A L'EMPLOI			Oui	0.12	1.13
Emploi stable	référence	référence	Non	référence	référence
Emploi précaire	0.51	1.66	NSP / NR	non significatif	non significatif
Chômeur	0.54	1.71	REGION		
Retraité	0.13	1.13	Ile-de-France	-0.45	0.64
Au foyer	non significatif	non significatif	Champagne-Ardenne	-0.48	0.62
Autre	0.18	1.20	Picardie	-0.48	0.62
NSP / NR	0.36	1.44	Haute-Normandie	-0.44	0.64
DOMICILE			Centre	-0.44	0.65
Domicile stable	référence	référence	Basse-Normandie	-0.27	0.76
Domicile précaire ou sans abri	0.57	1.76	Bourgogne	-0.40	0.67
NSP / NR	non significatif	non significatif	Nord-Pas-de-Calais	non significatif	non significatif
SITUATION FAMILIALE			Lorraine	-0.53	0.59
Seul sans enfants	0.38	1.46	Alsace	-0.39	0.67
Seul avec enfants	0.39	1.47	Franche-Comté	-0.44	0.65
En couple sans enfants	0.16	1.17	Pays-de-la-Loire	-0.16	0.85
En couple avec enfants	référence	référence	Bretagne	référence	référence
Avec d'autres membres de sa famille			Poitou-Charentes	-0.34	0.71
ou en collectivité	non significatif	non significatif	Aquitaine	-0.45	0.64
NSP / NR	non significatif	non significatif	Midi-Pyrénées	-0.33	0.72
REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) ET COUVERTURE			Limousin	-0.50	0.61
MALADIE UNIVERSELLE (CMU)			Rhône-Alpes	-0.39	0.68
RMI avec ou sans CMU	0.74	2.10	Auvergne	-0.35	0.71
CMU sans RMI	0.30	1.35	Languedoc-Roussillon	-0.39	0.68
Ni RMI ni CMU	référence	référence	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	-0.35	0.70
NSP / NR	non significatif	non significatif	Corse	-0.82	0.44
ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPE (AAH)			Guadeloupe	-0.49	0.61
Oui	non significatif	non significatif	Martinique	-0.47	0.63
Non	référence	référence	Guyane	-0.65	0.52
NSP / NR	non significatif	non significatif	La Réunion	-0.35	0.71

(1) Analyse réalisée avec un modèle de type LOGIT.

(2) Inclut les patients alcoolo-dépendants.

Sources : DREES-BESP, DRASS, FNORS et ORS,

enquête sur la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins.

Questionnaires utilisés pour l'enquête

ENQUÊTE ALCOOL AUPRÈS DES PATIENTS HOSPITALISÉS

Questionnaire à remplir pour tous les patients âgés de 16 ans ou plus

1. N° FINESS de l'établissement → _____

ne rien inscrire dans ces cases

2. Date d'enquête → _____

3. Date d'entrée dans le service → _____

4. Mode d'entrée dans le service → 6 Mutation 7 Transfert 8 Domicile

5. Absence de réponse → 1 Refus 2 Incapacité

Discipline du service (en clair)

Cachet du service

I. DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

6. Sexe → 1 Homme 2 Femme

7. Date de naissance → mois _____ année _____

8. Situation par rapport à l'emploi → 1 Emploi stable 3 Chômeur 6 Autre
2 Emploi précaire 4 Retraité 9 NSP/NR*
(CDD, intérim, stage) 5 Au foyer

9. Profession (pour les retraités et les autres personnes ayant déjà occupé un emploi, cocher la dernière profession exercée)

1 Agriculteur exploitant 4 Cadre ou profession intellectuelle supérieure 7 Ouvrier
2 Artisan, commerçant ou chef d'entreprise 5 Profession intermédiaire 8 Sans profession
3 Profession libérale 6 Employé 9 NSP/NR*

10. Domicile → 1 Stable (y compris les gens du voyage)
2 Précaire (amis, centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), foyers, squat)
3 Sans abri 9 NSP/NR*

11. Situation familiale → 10 Seul 11 avec enfant(s)
20 En couple 21 avec enfant(s)
30 Avec d'autres membres de sa famille 31 avec enfant(s)
40 En collectivité 41 avec enfant(s)
99 NSP/NR*

12. Situations particulières

12a. Revenu minimum d'insertion (RMI) 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
12b. Allocation d'adulte handicapé (AAH) 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
12c. Couverture maladie universelle (CMU) 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

13. Au cours des 12 derniers mois, le patient a-t-il été hospitalisé au moins 24 heures en raison d'un accident (de la route, du travail, de sport, au domicile) ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

14. Au cours des 12 derniers mois, a-t-il été prescrit à ce patient plus d'un arrêt de travail ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

15. Ce patient est-il en invalidité ou longue maladie ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

16. Ce patient bénéficie-t-il d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

II. QUESTIONNAIRE PATIENT

(poser les questions textuellement)

17. Habitudes tabagiques

17a. Fumez-vous, même occasionnellement ? → 1 Régulièrement 2 Une cigarette de temps en temps 8 Jamais 9 NSP/NR*

17b. Si vous fumez régulièrement, combien de cigarettes par jour fumez-vous ? _____ 98 Sans objet 99 NSP/NR*

17c. Si vous ne fumez pas actuellement, avez-vous fumé régulièrement dans le passé ? 1 Oui 2 Non 8 Sans objet 9 NSP/NR*

...

18. Questionnaire DETA

Au cours de votre vie :

- 18a. Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?
1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
- 18b. Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?
1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
- 18c. Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez Trop ?
1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
- 18d. Avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le matin pour vous sentir en forme ?
1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

19. Consommation d'alcool

Au cours des 12 derniers mois :

- 19a. Combien de fois vous arrive-t-il de consommer de l'alcool ?
8 Jamais → (ne pas poser les questions 19b et 19c)
1 Une fois par mois ou moins 3 Deux à trois fois par semaine 5 Tous les jours
2 Deux à quatre fois par mois 4 Quatre à six fois par semaine 9 NSP/NR*
- 19b. Les jours où vous buvez de l'alcool, combien de verres consommez-vous ?
1 Un ou deux 3 Cinq ou six 5 Dix ou plus
2 Trois ou quatre 4 Sept à neuf 8 Sans objet
9 NSP/NR*
- 19c. Combien de fois vous arrive-t-il de boire 6 verres ou davantage au cours d'une même occasion ?
8 Jamais 2 Une fois par mois 4 Tous les jours ou presque
1 Moins d'une fois par mois 3 Une fois par semaine 9 NSP/NR*

III. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

20. Motifs de recours, état de santé et antécédents (cocher autant de cases que nécessaire en 20a et 20b)

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>20a.
Le patient vient pour</p> <p><input type="checkbox"/>001
<input type="checkbox"/>002
<input type="checkbox"/>003
<input type="checkbox"/>004
<input type="checkbox"/>005
<input type="checkbox"/>006
<input type="checkbox"/>007
<input type="checkbox"/>008</p> <p><input type="checkbox"/>010
<input type="checkbox"/>011
<input type="checkbox"/>012
<input type="checkbox"/>013</p> <p><input type="checkbox"/>039
<input type="checkbox"/>040
<input type="checkbox"/>022
<input type="checkbox"/>055
<input type="checkbox"/>056</p> <p><input type="checkbox"/>038
<input type="checkbox"/>043
<input type="checkbox"/>044</p> <p><input type="checkbox"/>014
<input type="checkbox"/>015
<input type="checkbox"/>016
<input type="checkbox"/>017
<input type="checkbox"/>018
<input type="checkbox"/>057
<input type="checkbox"/>046</p> <p><input type="checkbox"/>058</p> | <p>20b.
Autre(s) problème(s)</p> <p>Douleur
 <input type="checkbox"/>101 Rachis
 <input type="checkbox"/>102 Appareil locomoteur
 <input type="checkbox"/>103 Douleur digestive
 <input type="checkbox"/>104 Céphalée
 <input type="checkbox"/>105 Autre</p> <p><input type="checkbox"/>106 Hémorragie (exclut plaie)
 <input type="checkbox"/>107 Insomnie ou trouble du sommeil
 <input type="checkbox"/>108 Symptomatologie fonctionnelle</p> <p>Traumatologie
 <input type="checkbox"/>110 Fracture
 <input type="checkbox"/>111 Plaie
 <input type="checkbox"/>112 Luxation ou entorse
 <input type="checkbox"/>113 Autre</p> <p>Tumeur maligne
 <input type="checkbox"/>139 (Esophage)
 <input type="checkbox"/>140 Foie
 <input type="checkbox"/>122 Voies aériennes supérieures
 <input type="checkbox"/>155 Bronches
 <input type="checkbox"/>156 Autres</p> <p>Pathologie digestive
 <input type="checkbox"/>138 Cirrhose hépatique
 <input type="checkbox"/>143 Pancréatite
 <input type="checkbox"/>144 Autre</p> <p>Affection cardio-vasculaire
 <input type="checkbox"/>114 Hypertension artérielle
 <input type="checkbox"/>115 Pathologie veineuse
 <input type="checkbox"/>116 Accident vasculaire cérébral (y compris séquelle sévère)
 <input type="checkbox"/>117 Cardiopathie ischémique
 <input type="checkbox"/>118 Autre</p> <p><input type="checkbox"/>157 Affection ostéo-articulaire
 <input type="checkbox"/>146 Affection de l'appareil respiratoire (inclut asthme, bronchite)
 <input type="checkbox"/>158 Affection de l'appareil génital et urinaire</p> | <p>20a.
Le patient vient pour</p> <p><input type="checkbox"/>064</p> <p><input type="checkbox"/>059
<input type="checkbox"/>060</p> <p><input type="checkbox"/>049
<input type="checkbox"/>050
<input type="checkbox"/>051
<input type="checkbox"/>052
<input type="checkbox"/>045</p> <p><input type="checkbox"/>061
<input type="checkbox"/>019
<input type="checkbox"/>063</p> <p><input type="checkbox"/>026
<input type="checkbox"/>027
<input type="checkbox"/>028
<input type="checkbox"/>029</p> <p><input type="checkbox"/>030
<input type="checkbox"/>031
<input type="checkbox"/>032</p> <p><input type="checkbox"/>034
<input type="checkbox"/>035
<input type="checkbox"/>036
<input type="checkbox"/>037
<input type="checkbox"/>066</p> <p><input type="checkbox"/>070
<input type="checkbox"/>071</p> | <p>20b.
Autre(s) problème(s)</p> <p><input type="checkbox"/>164 Grossesse, accouchement, puerpéralité (inclut IVG)
 Ophtalmologie
 <input type="checkbox"/>159 Cataracte
 <input type="checkbox"/>160 Autre</p> <p>Affection neurologique
 <input type="checkbox"/>149 Neuropathie périphérique
 <input type="checkbox"/>150 Épilepsie
 <input type="checkbox"/>151 Delirium tremens
 <input type="checkbox"/>152 Autre</p> <p><input type="checkbox"/>145 Trouble métabolique ou nutritionnel (inclut diabète, trouble du métabolisme des lipides, obésité)</p> <p><input type="checkbox"/>161 Affection dermatologique
 <input type="checkbox"/>119 ORL et stomatologie
 <input type="checkbox"/>163 Autre affection somatique (classer ici notamment les maladies infectieuses et les symptômes et maladies non mentionnés dans la liste ci-dessus)</p> <p>Trouble psychique
 <input type="checkbox"/>126 Psychose (schizophrénie et autres troubles délirants)
 <input type="checkbox"/>127 Dépression
 <input type="checkbox"/>128 Anxiété et autres troubles névrotiques
 <input type="checkbox"/>129 Troubles de la conscience et/ou du comportement lié à l'alcool</p> <p><input type="checkbox"/>130 Démence
 <input type="checkbox"/>131 Autre</p> <p><input type="checkbox"/>132 Tentative de suicide
 Abus ou dépendance aux substances psycho-actives
 <input type="checkbox"/>134 Alcool
 <input type="checkbox"/>135 Tabac
 <input type="checkbox"/>136 Psychotrope
 <input type="checkbox"/>137 Substance illégale</p> <p><input type="checkbox"/>166 Examen ou investigation sans mention de résultats anormaux
 <input type="checkbox"/>170 Raison économique ou sociale
 <input type="checkbox"/>171 Autre</p> |
|--|---|--|--|

21. Problème avec l'alcool

- 21a. Le patient a-t-il un problème avec l'alcool ?
1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
- 21b. Existe-t-il des signes de dépendance physique ? (syndrome de sevrage calmé par la prise d'alcool)
1 Oui 2 Non 8 Sans objet 9 NSP/NR*
- 21c. Prise en charge de la consommation excessive d'alcool
- | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 21c1. En médecine générale | <input type="checkbox"/> 1 Passée | <input type="checkbox"/> 2 En cours | <input type="checkbox"/> 3 Proposée | <input type="checkbox"/> 8 Sans objet |
| 21c2. Par une structure spécialisée | <input type="checkbox"/> 1 Passée | <input type="checkbox"/> 2 En cours | <input type="checkbox"/> 3 Proposée | <input type="checkbox"/> 8 Sans objet |
| 21c3. Association d'anciens buveurs | <input type="checkbox"/> 1 Passée | <input type="checkbox"/> 2 En cours | <input type="checkbox"/> 3 Proposée | <input type="checkbox"/> 8 Sans objet |

ENQUÊTE ALCOOL AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LES RÉGIONS

Questionnaire à remplir pour tous les patients de 16 ans ou plus, vus en consultation ou visite, lors de 2 journées durant la semaine du 16 au 21 octobre 2000

1. Numéro de dossier →

2. Date d'enquête →

3. Type d'acte → 1 Consultation 2 Visite

4. Patient vu pour la première fois ? 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

5. Absence de réponse : 1 Refus 2 Incapacité

I. DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

6. Sexe → 1 Homme 2 Femme

7. Date de naissance → mois année

8. Situation par rapport à l'emploi → 1 Emploi stable 3 Chômeur 6 Autre
 2 Emploi précaire (CDD, intérim, stage) 4 Retraité 9 NSP/NR*
 5 Au foyer

9. Profession (pour les retraités et les autres personnes ayant déjà occupé un emploi, cocher la dernière profession exercée)

1 Agriculteur exploitant 4 Cadre ou profession intellectuelle supérieure 7 Ouvrier
 2 Artisan, commerçant ou chef d'entreprise 5 Profession intermédiaire 8 Sans profession
 3 Profession libérale 6 Employé 9 NSP/NR*

10. Domicile → 1 Stable (y compris les gens du voyage) 2 Précaire (amis, centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), foyers, squat)
 3 Sans abri 9 NSP/NR*

11. Situation familiale → 10 Seul 11 avec enfant(s)
 20 En couple 21 avec enfant(s)
 30 Avec d'autres membres de sa famille 31 avec enfant(s)
 40 En collectivité 41 avec enfant(s)
 99 NSP/NR*

12. Situations particulières

12a. Revenu minimum d'insertion (RMI) 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
12b. Allocation d'adulte handicapé (AAH) 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*
12c. Couverture maladie universelle (CMU) 1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

13. Au cours des 12 derniers mois, le patient a-t-il été hospitalisé au moins 24 heures en raison d'un accident (de la route, du travail, de sport, au domicile) ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

14. Au cours des 12 derniers mois, a-t-il été prescrit à ce patient plus d'un arrêt de travail ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

15. Ce patient est-il en invalidité ou longue maladie ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

16. Ce patient bénéficie-t-il d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

II. QUESTIONNAIRE PATIENT

(poser les questions textuellement)

17. Habitudes tabagiques

17a. Fumez-vous, même occasionnellement ? → 1 Régulièrement 2 Une cigarette de temps en temps 8 Jamais 9 NSP/NR*

17b. Si vous fumez régulièrement, combien de cigarettes par jour fumez-vous ? 98 Sans objet 99 NSP/NR*

17c. Si vous ne fumez pas actuellement, avez-vous fumé régulièrement dans le passé ? 1 Oui 2 Non 8 Sans objet 9 NSP/NR*

...

18. Questionnaire DETA

Au cours de votre vie :

18a. Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

18b. Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

18c. Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez Trop ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

18d. Avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le matin pour vous sentir en forme ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

19. Consommation d'alcool

Au cours des 12 derniers mois :

19a. Combien de fois vous arrive-t-il de consommer de l'alcool ?

8 Jamais → (ne pas poser les questions 19b et 19c)
1 Une fois par mois ou moins 3 Deux à trois fois par semaine 5 Tous les jours
2 Deux à quatre fois par mois 4 Quatre à six fois par semaine 9 NSP/NR*

19b. Les jours où vous buvez de l'alcool, combien de verres consommez-vous ?

1 Un ou deux 3 Cinq ou six 5 Dix ou plus
2 Trois ou quatre 4 Sept à neuf 8 Sans objet

19c. Combien de fois vous arrive-t-il de boire 6 verres ou davantage au cours d'une même occasion ?

8 Jamais 2 Une fois par mois 4 Tous les jours ou presque
1 Moins d'une fois par mois 3 Une fois par semaine 9 NSP/NR*

III. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

20. Motifs de recours, état de santé et antécédents (cocher autant de cases que nécessaire en 20a et 20b)

20a. Le patient vient pour	20b. Autre(s) problème(s)	20a. Le patient vient pour	20b. Autre(s) problème(s)
<input type="checkbox"/> 001	<input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> 035	<input type="checkbox"/> 135
<input type="checkbox"/> 002	<input type="checkbox"/> 102	<input type="checkbox"/> 036	<input type="checkbox"/> 136
<input type="checkbox"/> 003	<input type="checkbox"/> 103	<input type="checkbox"/> 037	<input type="checkbox"/> 137
<input type="checkbox"/> 004	<input type="checkbox"/> 104	<input type="checkbox"/> 038	<input type="checkbox"/> 138
<input type="checkbox"/> 005	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 039	<input type="checkbox"/> 139
<input type="checkbox"/> 006	<input type="checkbox"/> 106	<input type="checkbox"/> 040	<input type="checkbox"/> 140
<input type="checkbox"/> 007	<input type="checkbox"/> 107	<input type="checkbox"/> 041	<input type="checkbox"/> 141
<input type="checkbox"/> 008	<input type="checkbox"/> 108	<input type="checkbox"/> 042	<input type="checkbox"/> 142
<input type="checkbox"/> 009	<input type="checkbox"/> 109	<input type="checkbox"/> 045	<input type="checkbox"/> 145
<input type="checkbox"/> 014	<input type="checkbox"/> 114	<input type="checkbox"/> 046	<input type="checkbox"/> 146
<input type="checkbox"/> 015	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 047	<input type="checkbox"/> 147
<input type="checkbox"/> 016	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 048	<input type="checkbox"/> 148
<input type="checkbox"/> 017	<input type="checkbox"/> 117	<input type="checkbox"/> 049	<input type="checkbox"/> 149
<input type="checkbox"/> 018	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> 050	<input type="checkbox"/> 150
<input type="checkbox"/> 020	<input type="checkbox"/> 120	<input type="checkbox"/> 053	<input type="checkbox"/> 153
<input type="checkbox"/> 021	<input type="checkbox"/> 121	<input type="checkbox"/> 054	<input type="checkbox"/> 154
<input type="checkbox"/> 022	<input type="checkbox"/> 122	<input type="checkbox"/> 062	<input type="checkbox"/> 162
<input type="checkbox"/> 023	<input type="checkbox"/> 123	<input type="checkbox"/> 064	<input type="checkbox"/> 164
<input type="checkbox"/> 024	<input type="checkbox"/> 124	<input type="checkbox"/> 065	<input type="checkbox"/> 165
<input type="checkbox"/> 025	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 067	<input type="checkbox"/> 167
<input type="checkbox"/> 032	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 068	<input type="checkbox"/> 168
<input type="checkbox"/> 033	<input type="checkbox"/> 133	<input type="checkbox"/> 069	<input type="checkbox"/> 169
<input type="checkbox"/> 034	<input type="checkbox"/> 134		

21. Problème avec l'alcool

21a. Le patient a-t-il un problème avec l'alcool ?

1 Oui 2 Non 9 NSP/NR*

21b. Existe-t-il des signes de dépendance physique ? (syndrome de sevrage calmé par la prise d'alcool)

1 Oui 2 Non 8 Sans objet 9 NSP/NR*

21c. Prise en charge de la consommation excessive d'alcool

21c1. En médecine générale 1 Passée 2 En cours 3 Proposée 8 Sans objet
 21c2. Par une structure spécialisée 1 Passée 2 En cours 3 Proposée 8 Sans objet
 21c3. Association d'anciens buveurs 1 Passée 2 En cours 3 Proposée 8 Sans objet